



www.sau.edu.pk

SINDH AGRICULTURE UNIVERSITY TANDOJAM

جلد-02، شمارو-04، آگست 2022ع



سند زراعي سائنس سوسائتي





سند زرعي سائنس سوسائٽي



سند زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

سند زرعي سائنس سوسائٽيءَ جا باني عهديدار

سرپرست پروفيسر ڊاڪٽر جان محمد مري پرو وائيس چانسلر	سرپرست اعليٰ پروفيسر ڊاڪٽر فتح محمد مري وائيس چانسلر
سينئر نائب صدر ڊاڪٽر محمد نعيم راجپوت	صدر پروفيسر ڊاڪٽر پائي خان سولنگي
جنرل سيڪريٽري پروفيسر ڊاڪٽر شاهنواز مري	نائب صدر ڊاڪٽر پنجل خان ٻٽ
فنانس سيڪريٽري ڊاڪٽر عرفان احمد گلال	ايڊيشنل جنرل سيڪريٽري ڊاڪٽر محمد سليم سرڪي
آفيس سيڪريٽري محمد علي شيخ	انفارميشن سيڪريٽري پروفيسر محمد مل جسڪاڻي

ايگزيڪيوٽو ڪائونسل

پروفيسر ڊاڪٽر تهمينه مڱڻ	پروفيسر ڊاڪٽر اعجاز حسين سومرو
پروفيسر ڊاڪٽر عقييل احمد ميمڻ	پروفيسر ڊاڪٽر منير احمد مڱريو
ڊاڪٽر علي رضا شاهه	پروفيسر ڊاڪٽر امتياز احمد نظاماڻي
ڊاڪٽر ذوالفقار علي عباسي	پروفيسر ڊاڪٽر تنوير فاطمه مياڻو
محمد سليم چانگ	ڊاڪٽر محمد يعقوب ڪونڌر

انڊريس: سند زرعي سائنس سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي، سند زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام

Email: bksolangi@gmail.com Call: 0300-3796765

سرپرست
پروفيسر ڊاڪٽر جان محمد مري
 پرو وائيس چانسلر

سرپرست اعليٰ
پروفيسر ڊاڪٽر فتح محمد مري
 وائيس چانسلر

چيف ايڊيٽر
پروفيسر ڊاڪٽر يائي خان سولنگي

ايگزيڪيوٽو ايڊيٽر
پروفيسر ڊاڪٽر منظور علي ابڙو
 ڊين، فيڪلٽي آف ڪراپ پروٽيڪشن

مئنيجنگ ايڊيٽر
پروفيسر محمد منل جسڪاڻي

ايڊيٽرس

- | | |
|--|---|
| <p>☐ ايگريڪلچرل انجنيئرنگ</p> <p>☐ ڊاڪٽر معشوق علي تالپر</p> <p>☐ ڊاڪٽر محمود لغاري</p> <p>☐ اينٽيمل هسبنڊري ۽ وٽنري سائنسز</p> <p>☐ ڊاڪٽر ريحانه پرڙو</p> <p>☐ ڊاڪٽر محمد نعيم راجپوت</p> <p>☐ ڏوڪري ڪئمپس</p> <p>☐ ڊاڪٽر ذوالفقار علي عباسي</p> <p>☐ خيرپور ڪئمپس</p> <p>☐ ڊاڪٽر علي رضا شاه</p> <p>☐ عمرڪوٽ ڪئمپس</p> <p>☐ محمد سليم چانگ</p> | <p>☐ ڪراپ پراڊڪشن</p> <p>☐ ڊاڪٽر شاهنواز مري</p> <p>☐ ڊاڪٽر محمد نواز ڪانڌڙو</p> <p>☐ فوڊ سائنسز</p> <p>☐ ڊاڪٽر اعجاز حسين سومرو</p> <p>☐ ڪراپ پروٽيڪشن</p> <p>☐ ڊاڪٽر امتياز احمد نظاماڻي</p> <p>☐ ايگريڪلچرل سوشل سائنسز</p> <p>☐ ڊاڪٽر تهمينه مڱڻ</p> <p>☐ ممتاز علي جويو</p> <p>☐ انفارميشن ٽيڪنالاجي</p> <p>☐ ڊاڪٽر پنجل خان پٽ</p> <p>☐ ڊاڪٽر سهڻي عباسي</p> |
|--|---|

مواد موڪلڻ ۽ رابطي لاءِ:

چيف ايڊيٽر، ماہوار زرعي سائنس، سنڌ زرعي سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٽامالاجي، سنڌ زرعي يونيورسٽي، تنڊوڄام

Email: bksolangi@gmail.com Cell # 0300-3796765

ڪمپوزنگ: نور نواز حاجاڻو (اسٽينوگرافر، سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي)



پروفیسر ڈاکٲر یائی خان سولنگی

صدر، سنڌ زرعی سائنس سوسائٲی

چیف ایڊیٲر، ماهوار زرعی سائنس

سنڌ زرعی یونیورسٲی ٲنڊوچار

ایڊیٲوریل

زرعی سائنس مئگزیین جو آگسٲ 2022ع جو شمارو اوهان جي هٿن ۾ آهي. هن شماري ۾ موسمي فصلن بابت ڪمائٽي ڄاڻ موجود آهي، جنهن مان اسان جا پڙهندڙ گهڻو لاڀ حاصل ڪري سگهن ٿا. جيئن ته هي مهينو موسمي برساتن جو آهي، ۽ موسميات کاتي پاران ٻڌايو پيو وڃي ته گذريل ڪيترن ئي سالن جي ڀيٽ ۾ هن سال وڏي برسات ٿيندي. هن موسم جي فصلن ۾ وونئڻ ۽ ڪجي اهم آهن، جن مان آبادگار گهڻو منافعو ڪمائي سگهن ٿا، ان ڪري انهن کي بچائڻ لاءِ ٽڪڙا ڀاءُ وٺڻ جي ضرورت آهي. ڪوشش ڪجي ته جتي جتي ڦٽي چوندبي لاءِ تيار هجي، اُتي چوندبي جي عمل کي تيز ڪجي ۽ ڪجين ۾ جتي ميوو تيار هجي، اُن کي پٽائي ڇڏجي ته جيئن برسات سبب اهوضايع ٿيڻ کان بچي وڃي. ڏٺو وڃي ته هي ٻئي فصل ڏاڍا اهم آهن، جيڪي گهڻي پاڻي سبب خراب ٿي وڃن ٿا، تيار ڦٽي جو به جيڪڏهن وقت سر چوندبو نه ٿيو ته زمين تي ڪري خراب ٿي ويندي ۽ ڪجور به وڻ مان زمين تي پاڻي ۾ ڪريو ته خراب ٿي ويندو. ان ڪري بهتر حڪمت عملي ذريعي ٻنهي فصلن کي بچائجي. گڏوگڏ اهوپڻ ضروري آهي ته هر آبادگار پنهنجي زمين جي ايراضيءَ جي ٻاهران برسات جي پاڻيءَ جي نيڪال ۽ اُن کي هڪ پاسي نيڪال ڪرڻ لاءِ کڏ يا وڏي نالي ٺهرائي سگهي ٿو. جيئن وقت سر هڪ پاسي پاڻي کي نيڪال ڪري باقي فصل کي بچائي سگهجي. هي اهڙا ڪم آهن، جيڪي آبادگار آسانيءَ سان پاڻ ڪري سگهي ٿو. هن ۾ ڪنهن به سرڪاري سهڪار جي ضرورت نه آهي. جيڪڏهن سڀني آبادگار ائين ڪندا ته اسان سمجهون ٿا فصل کي گهڻي نقصان کان بچائي سگهون ٿا.

زرعی سائنس مئگزیین جي پليٽ فارم تان پڙهندڙن تائين جديد ۽ تحقيقي مواد پهچائڻ جو سلسلو جاري آهي، مئگزیین جي هن شماري ۾ موسمي تبديلين جا زراعت تي اثر، وونئڻ جي فصل ۾ گلابي ڪينٽين جو نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا، نيفر جي مدد سان وونئڻ جي جيت ميلي بگ تي حياتياتي ضابطو ۽ ٻيا اهم مضمون شامل آهن، جيڪي يقيناً عام پڙهندڙن سميت آبادگارن ۽ شاگردن سان گڏوگڏ زرعی محققن، توسيعڪارن ۽ استادن لاءِ به ڪارائتا ٿيندا.

هڪ ٻئي لاءِ نيڪ تمنائون ۽ دعائون

پیغام



پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد مری

وائیس چانسلر

بانی سرپرست اعلي، سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي، ماهوار زرعي سائنس
سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

ماحولياتي تبديليءَ جي ڪري ڪيترائي نوان خطرا سڄي دنيا تي اثر انداز ٿي رهيا آهن، جن جو هڪ سبب گدلاڻ جو وڌڻ ۽ موسمن جي تبديلي آهي. سامونڊي طوفانن سبب ڀيٽن وارا ڪيترائي شهر ۽ ملڪ تباهيءَ جو شڪار ٿي رهيا آهن، گڏوگڏ تيز برساتن جي ڪري گهڻا شهر پنهنجي سونهن ۽ جاگرافي وڃائڻ تي آهن. موسميات کاتي پاران سنڌ سميت پاڪستان ۾ تمام گهڻين برساتن پوڻ جي اڳ ڪٿي ڪئي وئي آهي، ان لاءِ هي مهينو انتهائي اهم آهي، توڙي جو اسان جي عوام ۾ ان حوالي سان ڪا سنجيدگي نٿي ڏسجي، پر تاريخ جي وڏين برساتن جي ڳالهه معمولي نه آهي، ان لاءِ اسان کي ضرور سوچڻ گهرجي ۽ پنهنجن اثائن، گهرن ۽ فصلن کي بچائڻ لاءِ هينئر کان ئي فڪر مند ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته جڏهن برساتي سلسلو شروع ٿي ويو ۽ حالتون اسان جي وس کان ٻاهر نڪري ويون ته يقيناً پوءِ اسان سواءِ پچتائڻ جي ڪجهه ڪرڻ جي قابل نه رهنداسين. ان ڪري اڳوات حڪمت عملي جوڙڻ گهرجي. گڏوگڏ اسان حڪومتي سطح تي به اها گهر ڪنداسين ته برساتي پاڻي کي سمند ڏانهن نيڪال ڪرڻ لاءِ مناسب رستن جي چونڊ ڪرڻ گهرجي ۽ ان وچ ۾ جيڪي به رنڊڪون پئجي ويون آهن، انهن کي ختم ڪرڻ گهرجي ته جيئن اهو پاڻي آسانيءَ سان بنا نقصان ڪرڻ جي سمند ۾ چوڙ ٿي وڃي. جيڪڏهن اسان هنن برساتن ۾ پنهنجي زراعت کي نه بچائي سگهياسين ته ان ۾ ڪوشش ناهي ته ايندڙ وقت ۾ اسان وٽ خوراڪ جو وڏو بحران اچي سگهي ٿو. تنهنڪري اسان کي مناسب حڪمت عملي جوڙي هنن طوفاني برساتن کان پاڻ کي بچائڻ گهرجي.

پیغام



پروفیسر ڈاکٹر جان محمد مری

پرو وائیس چانسلر

بانی سرپرست، سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي، ماهوار زرعي سائنس

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

سنڌ سميت سڄي ملڪ ۾ هن وقت آبادگار وڏي پريشانيءَ ۾ مبتلا آهن، ڇاڪاڻ جو تمام گهڻين موسمي برساتن جون اڳڪٿيون ٿي رهيون آهن، جيڪي آبادگارن کي وڏي نقصان جا اشارا ڏئي رهيون آهن. هن وقت هڪ طرف ٻين فصلن سان گڏ وڌيڪ مناعلي وارو فصل وونتڻ تيار آهي، مختلف علائقن ۾ چونڊو ٿي رهيو آهي، ۽ ڪٿي ڪجهه ڏينهن ۾ چونڊو شروع ٿيندو. گذريل سال جي پيٽ ۾ هن سال ڦٽيءَ جا اگهه به ڏاڍا سٺا ملي رهيا آهن، جنهن مان آبادگارن کي گهڻي فائدي ٿيڻ جا امڪان آهن، انڪري اهڙي مناعلي واري فصل دوران برساتن جو پوڻ، يعني سڀ ڪجهه ختم ٿيڻ برابر آهي، ۽ الله نه ڪري جي ائين ٿيو ته آبادگار جيڪو اڳ ئي گهڻين مصيبتن کي منهن ڏئي رهيو آهي، اهو وڌيڪ پنڌي پئجي ويندو، جيڪو نه صرف ان جو نقصان آهي، بلڪ ملڪ جو به وڏو نقصان ثابت ٿيندو. آبادگار کي اڳ ئي هن سال ۾ پاڻي جي کوٽ گهڻو پريشان ڪيو، پيو وڌندڙ مهانگائي، جنهن ڪري زرعي دوائن، پاڻ ۽ مشينريءَ جي اگهن ۾ ايترو ته اضافو ٿيو آهي، جو آبادگار وٽ ڪجهه بچيو ئي ناهي.

اسان زرعي سائنس مئگزين جي پليٽ فارم تان آبادگار پائرن کي اها صلاح ڏيون ٿا ته برساتن جا امڪان اٽل آهن، ان ڪري جتي جتي ٿين ۽ ٻين فصلن جي چونڊي جي ضرورت آهي، اُتي فوراً چونڊو ڪرايو وڃي، تيار فصلن مان پاڻيءَ جي بهتر نيڪال لاءِ حڪمت عملي جوڙي وڃي ته جيئن امڪاني برساتن جي صورت ۾ فصل کي بچائي سگهجي.

سارنگ

غلام محمد ”غازي“

شڪارپور

سارنگ رات ڪيو وسڪارو
ڪيڏو نه نرمل آھ نظارو.

وڻ ٿڻ ڏوبِي اجرا ٿي ويا،
ساوا ساوا سهڻا ٿي ويا.

هیر تڏيري فرحت ڏئي ٿي،
منهنجي دلڙي گيت چوي ٿي.

مکڙيون مهڪي گل ڦل ٿينديون،
منهنجي مَن ۾ خوشيون اينديون.

واھ به ڀرجي وهندا هاڻي،
ساوڪ ٿيندي رب ٿو ڄاڻي.

سهڻا رنگ رنگيءَ رچايا،
فصل به لهندا مڙندي مايا.

پرڻپ پڪيٽڙا لات لنون ٿا،
ڪا ته اسان کي ڳالهه چون ٿا.

دل کي وڻندڙ آ وڻڪاري،
ساوڪ سبزي ۽ گلڪاري

سائينءَ کي ٿا سڀ ساراهيون،
اچو ته گڏجي سارنگ ڳايون.

فهرست

صفحو	مصنف	عنوان
07	غلام قادر منگريو	▪ وونتڻ جي فصل ۾ گلابي ڪينٽين جو نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا
09	اشفاق علي ڏونڙو	▪ نيفر جي مدد سان وونتڻ جي جيت ميلي بگ تي حياتياتي ضابطو
11	ڊاڪٽر شاهه نواز ڪهڙو	▪ برسات جي موسم ۾ وونتڻ جي حفاظت
12	آڪاش پنهور	▪ ميمڻ جي پوک
13	ڊاڪٽر ممتاز علي ساند، ڪاشف ڪريم قليو	▪ 2022ع جي برسات ۽ ڪجيءَ جي فصل کي پهچندڙ نقصان
15	پروفيسر محمد منل جسڪاڻي	▪ برسات، زراعت ۽ اضافي پاڻي جو نيڪال!
16	ابرار احمد مجيد اڻو	▪ برسات کانپوءِ فصلن جي بچاءَ جي حڪمت عملي
17	ڊاڪٽر لياقت علي پٿو	▪ آگسٽ مهيني ۾ برسات کان فصلن کي بچائڻ
18	غلام قادر منگريو	▪ موسمي تبديلين جا زراعت تي اثر
20	ڊاڪٽر الطاف سيال	▪ ڇا سمنڊ سنڌوءَ جي ڊيلٽا کي ڳيهي ويندو؟
23	گلشير لوچي	▪ پروفيسر ڊاڪٽر محمد خان لوهار: تعزيتي ميڙاڪو

وونئڻ جي فصل ۾ گلابي ڪينڙن جو نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا

غلام قادر منگريو

ايگريڪلچر آفيسر زرعي توسيع کاتو

ضلع سانگهڙ


gh.qadernangrio@gmail.com

ڪيڙي جي نقصان جي ڪري پاڪستان ۾ سالانه 10 لک ڪپھ جون گھٽريون گھٽ ٿين ٿيون. هي ڪيڙو نه صرف ڪپھ جي پيداوار گھٽائي ٿو پر ڪپھ جي معيار کي به گھٽائي ٿو جنھن جي ڪري مارڪيٽ ۾ اسان جي ڪپھ کي گھربل اگھ به نٿو ملي.

سنڌ ۾ گلابي ڪيڙي جو حملو اڪثر ڪري ووڻن جي شروعاتي مرحلي يعني اپريل، مئي جي مهينن ۾ ٿئي ٿو پر هن ڪيڙي جو شديد حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر جي مهينن ۾ ڏٺو ويو آهي. هن ڪيڙي جون هڪ سال ۾ عموماً 4 کان 6 پيڙهيون ٿين ٿيون. هن جي مادا 150 کان 200 آنا ڪپھ جي گلن، گوگڙن ۽ مڪڙين تي لاهي ٿي، جنهن مان 7 ڏينهن جي اندر ڪيڙا ڦٽن ٿا ۽ اُني مان نڪرندڙ ڪيڙو هڪ ڪلاڪ جي اندر گل يا گوگڙي ۾ سوراخ ڪري اندر داخل ٿي ٿو. گوگڙي جي اندر داخل ٿي ڪري هي ڪيڙو سڀ کان پهريائين سوراخ کي بند ڪري پوءِ اندران ئي اندران ڪپھ جي گل ۽ گوگڙي کي کائيندو رهي ٿو. جڏهن هي ڪيڙو ڪپھ جي گل ۾ داخل ٿئي ٿو ته گل کي پنڪڙين کي اندران هڪ مادي جي مدد سان بند ڪري ٿو جنهن سان گل ماندائي جي شڪل وانگر نظر ايندو آهي. گوگڙي ۽ گل جي اندر بند هجڻ جي ڪري زهرن سان هن ڪيڙي تي ضابطو ڪرڻ تمام گھڻو ڏکيو آهي. ۽ گلابي ڪينڙي جي حملي وارو گوگڙو صحيح طريقي سان ٽڙي نه سگھندو آهي. پوءِ اهو ڪينڙو 10 کان 14 ڏينهن اندر پنهنجي لاروا يا ڪينڙي وارو مرحلو پورو ڪري زندگي جي اڳئين مرحلي يعني سوپٽ ۾ داخل ٿئي ٿو. جتي هي پهچي پاڻ کي هڪ خول ۾ بند ڪري ٿو. اهو مرحلو گھڻو ڪري گوگڙي مان ٻاهر نڪري ڪري هيٺ زمين تي يا سُڪل پنن وغيره تي گذاري ٿو پوءِ 10 کان 12 ڏينهن اندر پيپو يا خول مان بالغ پروانو ٿي نڪري ٿو. جيڪي پروان وري اڳتي جنسي ميلاپ ڪري آنا لاهين ٿا ۽ زندگي جي روانگي کي جاري رکن ٿا.

گلابي ڪيڙي جي هڪ خاص خاصيت اها به آهي ته هي ڪيڙو سياري جي موسم هائبرنيشن (بغير کائڻ پيئڻ جي ننڊ سمهڻ) ۾ 3 کان 4 مهينا گذاري ٿو. هائبرنيشن لاءِ گلابي ڪيڙو ڪپھ جي ڪن ڪچري، سڪل پنن گوگڙن، سونگڙين، جنگل ڪارخانن جي ٻاهراچليل ڪپھ جي ڪچري، سڪل وائڻين جيڪي اڪثر ڪري اسان جا آبادگار زمين ۾ ئي رکندا آهن ۽ سڄو سال مودي رکجن ٿا ووڻن جي فصل ۾ سياري گذاري ٿو. جئين مٿي ذڪر ڪيل آهي ته زهر سان هن ڪيڙي تي ضابطو ڪرڻ تمام ڏکيو آهي.

جيئن ته ووڻن اسان جي ملڪ پاڪستان جي فصلن مان هڪ اهم فصل آهي. جنهن جي پوک تقريباً 2.53 ملين هيڪٽرن تي ٿئي ٿي. ڪپھ جي ملڪي پيداوار (8.84 Million Bales) آهي. ووڻن جي فصل تي مختلف قسم جا جيت ۽ بيماريون حملو ڪن ٿا. جنهن مان گلابي ڪينڙو (Pink bollworm) به هڪ آهي. هي ڪينڙو تمام خطرناڪ جيت آهي. جيڪو صرف ڪپھ جي فصل تي حملي



گلابي ڪيڙي جي زندگي جو ڦيرو

آڻ ٿئي ٿو. هي ڪينڙو جنهن کي عام ٻولي ۾ گلابي ڪينڙو به چئجي ٿو. گلابي ڪينڙو جنهن جو سائنسي نالو پيڪٽينوفوروگوسپائيل آهي، ڪيڙن جي خاندان گيلي چڊي سان تعلق رکي ٿو. هي ڪينڙو ووڻن جي فصل جي گل، مڪڙين ۽ گوگڙن کي کائي ناس ڪري ٿو. هڪ اندازي موجب هي ڪيڙو ڪپھ جي پيداوار کي 20 کان 30 سيڪڙو نقصان ڏي ٿو. هن

گلابي ڪيڙي کي ڪنٽرول ڪرڻ جا ماحول دوست طريقا.

1. جنسي ڦٽندڙ جو استعمال (Sex Pheromone Traps).

گلابي ڪيڙي کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ عام طور تي زرعي زهرن جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. جيڪو هڪ تمام مهانگو ۽ ماحول دشمن طريقو آهي. جيئن ته گلابي ڪيڙيون ڀاڻ مان نڪرڻ بعد هڪ ڪلاڪ جي اندر گوگڙي اندر هليو ٿو وڃي سو هن تي زهر وسيلي ضابطو ڪرڻ تمام ڏکيو آهي.

گلابي ڪيڙي تي ضابطي ڪرڻ جو هڪ ماحول دوست طريقو جنسي ڦٽندڙ (Sex Pheromone Trap) جو استعمال آهي. جيئن ته گلابي ڪيڙي جي مادي جڏهن جنسي ميلاپ (Mating) ڪرڻ جي خواهش ڪري ٿي ته هڪ فيرامون (Pheromone) يا خوشبو ڇڏي ٿي ۽ پوءِ هن خوشبو تي نر پروانه (Male Moths) ڇڪجي اچن ٿا ۽ مادي سان ميلاپ ڪن ٿا. ان کان بعد مادي بيضا (Eggs) لاهي ٿي ۽ جنهن مان ڪيڙيون نڪري ڪري گوگڙن کي کائين ٿا.

زرعي سائنسدانن اها ساڳئي خوشبو/فيرامون هٿرادو طريقو سان ٺاهي ورتو آهي ۽ هن فيرامون يعني هٿرادو خوشبو جا ڪئپسول مارڪيٽ ۾ آساني سان دستياب آهن. هڪ ايڪڙ ۾ 6 کان 8 ڪئپسول لڳايا ويندا آهن. ڪئپسول هڪ خاص قسم جي برني ۾ لڳايو ويندو آهي جنهن کي ٽريپ سڏبو آهي، جيڪڏهن ٽريپ (برني) دستياب نه هجي ته ڪئپسول کي 1.5 ليٽر پاڻي واري خالي بوتل کي ڪٽي، هن ۾ ٻه لڳائي سگهجي ٿو. خالي بوتل جي مٿئين حصي ۾ ٻه سوراخ ڪيا جنهن ۾ ڪئپسول لڳائبو ۽ بوتل جي هيٺئين حصي ۾ صرف مليل پاڻي وجهبو ته جئين ڇڪجي ايل نر پروانا پاڻي ۾ ڪري پون. برني يا بوتل مان هر ٽن ڏينهن کان پوءِ ڦاٿل نر پروانن کي ٻاهر ڪڍي تازو پاڻي ڀرجي. پاڻي ٻاهر ڪڍڻ مهل ڪنهن ڪپڙي جي مدد سان ڇاڻي وٺجي ته جئن پروانن جو تعداد به معلوم ٿي سگهي. هي ڪئپسول هڪ مهيني لاءِ ڪارآمد هوندا آهن، مهيني کان پوءِ به جيڪڏهن ضرورت هجي ته نوان ڪئپسول لڳائجن. نر پروانن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪري گلابي ڪيڙي جي مادي وائي آنا لاهيندي جنهن مان ڪيڙا ڪونه نڪرندي ۽ نتيجي ۾ ووڙڻ جو فصل گلابي ڪيڙي کان محفوظ رهندو.

2. هاري دوست جيتن جو استعمال.

گلابي ڪيڙي کي کائيندڙ هاري دوست جيتن جي سڃاڻپ به تمام ضروري آهي. ڪافي اهڙا هاري دوست جيت موجود آهن

جيڪي گلابي ڪيڙي کي قدرتي طور کائي ناس ڪن ٿا. جهڙوڪ ليڊي برڊ بيل (ٽنڊڻيون)، ڪرائيسوپا، ايپن ٽيلس (ڪڪر جهڙو منگهڻ)، اورئيس بگ (وڏين اکين وارو منگهڻ)، طفيلي ڪيڙا، ڪوربيٽرو ۽ پنيوري وغيره. اسان جي آبادگارن کي هنن هاري دوست جيتن جي سڃاڻپ رکڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن هاري دوست جيتن جو تعداد وڌيڪ هجي ته زهرن جو ڦوهارو نه ڪجي. اهي هاري دوست جيت قدرتي طريقي سان گلابي ڪيڙي ۽ ٻين نقصان ڏيندڙ جيتن تي ضابطو رکندا.

آبادگار پائرن لاءِ گلابي ڪيڙي کان بچاءُ جو خاص

هدايتون.

- گلابي ڪيڙي خلاف قوت مدافعت رکندڙ (بي) ٽي جنسن جي چونڊ ڪريو.
- ووڙڻ جي پوکي هميشه شفارس ڪيل وقت تي ڪجي، گهڻو آڳاٽي پوکي به گلابي ڪيڙي جي حملي کي وڌائي ٿي.
- ووڙڻ جي فصل جون بقايا جات، سڪل پن گوگڙا، سونگهڙيون، سڪل واٽانيون وغيره زمين ۾ هرگز نه رکن.
- ووڙڻ جي فصل ختم ٿيڻ تي واٽانيون ڪٽي ساڙي ڇڏجن ۽ پٺيءَ کي صحيح نموني صاف ڪجي ۽ اڳئين فصل لاءِ زمين تيار ڪجي.
- ووڙڻ جي فصل کي موسم ختم ٿيڻ کان پوءِ وڌيڪ وقت لاءِ زمين ۾ نه بيهارجي. موڊي فصل رکڻ کان پريهيز ڪجي.
- ووڙڻ جي فصل جي هر هفتي جانچ پڙتال ڪندو رهجي، جئين ئي ماڏاڻي وانگر گل نظر اچن ته هڪدم زرعي ماهرن سان مشورو ڪجي ۽ مناسب تدارڪ جو طريقو استعمال ڪجي.
- شروعاتي وقت ۾ ماڏاڻي وارن گلن کي هٿ سان پٽي پوءِ ساڙي ڇڏجن يا کڏ ڪوتي ان ۾ پوري ڇڏجن.
- گلابي ڪيڙي جي ضابطي لاءِ پهريائين صفائي سٿرائي، جنسي ڦٽندڙ جو استعمال، حياتياتي طريقن جو استعمال ڪجي.
- جننگ فيڪٽرين جي ٻاهريان سونگڙين ۽ ڪپه مان نڪرندڙ ٻئي ڪچري کي محفوظ طريقي سان ساڙي ناس يا ختم ڪجي.
- آخري حل طور جيڪڏهن زهرن جي استعمال وارو طريقو اپنائڻ اٿر هجي ته ڪنهن ويجهي زرعي ماهر کان مشورو ڪري، ماحول دوست زرعي زهر جي چونڊ ڪجي، صحيح مقدار، درست طريقي سان ۽ صحيح وقت تي استعمال ڪجي.

نير جي مدد سان وونئڻ جي جيت ميلي بگ تي حياتياتي ضابطو

اشفاق علي ڏوئرو

پروجيڪٽ مينيجر اين اي ايف آر پروجيڪٽ سنڌ

ڪيب انٽرنيشنل، راولپنڊي، پاڪستان

a.dhanunroo@cabi.org

نير ڇا آهي؟

نير کي سنڌي ۾ (فائيديمند زرعي جيتن جي افزائش جو مرڪز) چيو ويندو آهي. هيءَ ليبارٽري فصلن جي فارمن تي قائم ڪئي ويندي آهي ته جيئن فائيديمند جيتن جهڙوڪ طفيلي جيت ۽ شڪاري جيتن جو بچاءُ ڪري سگهجي.

فائيديمند جيتن جي افزائش جي مرڪز (نير) جي ٺاهڻ جو طريقو.

هن منصوبي تحت شروعات ۾ ضلعي سانگهڙ ۾ 2400 ايڪڙن تي 12 نير ٺاهيا پيا وڃن جن جي مدد سان فائيديمند جيتن جي واڌ ويجهه ڪئي ويندي.

نير ٺاهڻ لاءِ $10 \times 40 \times 20$ ڦٽ جي پيمائش رکي ويندي آهي ۽ اهو نير چار ئي طرفن کان کليل رهندو آهي ۽ ان جي اندر لوهه جي پيٽين ۾ پينڊين ۽ وونئڻ جا نقصان شده پن رکيا ويندا آهن جيڪي گهٽ ۾ گهٽ 15 ڏينهن لاءِ رکيا ويندا آهن ته جيئن فائيديمند جيت اچي ان تي حملو ڪن ۽ ان سان گڏو گڏ اهي فائيديمند جيت پهنجو نسل وڌائين. ان ڪم لاءِ مٽي ٻڌايل سڀ طريقه اختيار ڪيا ويندا آهن.

دنيا ۾ زهريلي دوائن جو فصلن جي جيتن تي ضابطو ۽ زمين جي زرخيزيءَ جو ختم ٿيڻ جيڪو نامياتي پائڻ جي ڪري ٿيو آهي. جنهن جي ڪري دنيا هائي ڪيميائي طريقي سان روڪ ٿام واري سوچ کان هتي ڪري ماحولياتي تدارڪ لاءِ ڪم ڪري پئي جنهن ۾ نقصانڪار جيتن کان بچاءُ لاءِ ماحولياتي مطابق ضابطن ڏانهن لاڙو ڪري رهيا آهن. انهي سان گڏوگڏ نامياتي پائڻ (هٿرادا پائڻ) کي غيرنامياتي

پائڻ (ڪيميائي پائڻ) تي پڻ فوقيت ڏني پئي وڃي. ساڳئي طرح سان سنڌ حڪومت پڻ ماحول آلوده ڪندڙ پائڻ ۽ جيت مار دوائن تي ضابطو آڻڻ لاءِ 2018 کان 2030 تي عمل درآمد ڪري رهيا آهن. انهي بابت پاڇين، ميون ۽ ٻين فصلن تي زرعي زهرن جو اثر جيڪو پڻ هڪ وڏو اهم مسئلو آهي (سنڌ زراعت جو 2018 کان 2030 تائين سنڌ ڪابيني کان 16 اپريل 2018 تي منظور شده منصوبو).

فصلن تي جيت مار زهرن جي استعمال کي گهٽائي مڪيه فصلن جي نقصانڪار جيتن تي ضابطو آڻڻ لاءِ حياتياتي طريقن تي عمل درآمد ڪرڻ لاءِ پهرين جنوري 2019 تي SIAPEP ۽ CABI جي وچ ۾ پن سالن جي منصوبي لاءِ معاهدو ٿيو آهي. هن منصوبي تحت سنڌ ۾ لڳ ڀڳ 10,000 ايڪڙن تي مشتمل زميندارن جي زمين تي (نقصانڪار جيتن جي قدرتي طفيلي جيتن جي افزائش وڌاري لاءِ) NEFRs (هاري دوست جيتن جي پناهگاهه) جنهن ۾ جيڪي محمود ۽ ٻين وارا طريقا (2011 ۽ 2018) جي اصولن موجب جوڙيا پيا وڃن.

هتي آئون ڪجهه تمام سنجيده ۽ ڦٽي جي فصل کي تمام گهڻو نقصان ڏيندڙ جيت ميلي بگ جي زندگي جي متعلق ۽ انهي کي مد نظر رکندي حياتياتي طريقي سان تدارڪ ڪرڻ جي طريقن متعلق ٻڌائينداسين. وونئڻ جي فصل لاءِ (12) نير NEFRs (هاري دوست جيتن جي پناهگاهه) جيڪي وونئڻ جي جيت ميلي بگ جي طفيلي جيتن جي افزائش ۾ واڌاري ۽ فصل جي بچاءُ لاءِ هي مخصوص ڇيرا قائم ڪيا پيا وڃن.



بالغن جي ظاهري جسماني بناوت:

هن جيت جي بالغ جي جسم جي مٿا پتا ٿين ٿا ۽ اهي پاڻڊر ۽ تيل نم تهه سان ڍڪيل هوندا آهن. اهو تهه تمام نازڪ ٿئي ٿو جيڪو ٿوري به هٿ لڳائڻ سان لهي ويندو آهي

۽ هٿن تي چڪناھت وانگر محسوس ٿيندو آھي. ميلي بگ جي بالغ مادي ۾ کان پنج ملي ميٽر ڊگھي ۽ ۾ کان چار ملي ميٽر ويڪري ٿيندي آھي ۽ ان جي پچڙي واري حصي ۾ هڪ ڪمزور جھلي ٿئي ٿي جيڪا ٿوري به هٿ يا ڪنھن شي سان رڳڙجڻ جي ڪري ٽٽي پوندي آھي ان جھليءَ ۾ مادي پھنجا بچا ڏيندي آھي.

پاڪستان سنڌ ۾ ميزبان فصل

هڪ تحقيق مطابق پاڪستان ۾ ميلي بگ جا 154 ميزبان ٻوٽا ٽين ٿا جن ۾ وونڻن جو فصل هن جو پسنديدہ ميزبان ٻوٽو ڄاتو وڃي ٿو. هن جيت کي پاڪستان ۾ مختلف موسمن ۽ مختلف علائقن ۾ نقصان ڪندي ڏٺو ويو آھي. هن جيت جا ڪجهه خاص ميزبان ٻوٽا هيٺ ڏجن ٿا جن کي هي جيت تمام گھڻو پسند ڪندو آھي.

چائڻ روز سورج مڪي، ٿامڻ، واڱڻ ۽ پينڊيو.

ميلي بگ جيت جي زندگي جو چڪر:

هن جيت جي مادي نر جي ميلاپ کان بغير به پھنجي ٻچن کي جنم ڏيندي آھي. ميلي بگ جي مادي 150 کان 600 ھلڪي پيلي رنگ جا انڊا ڏيندي آھي هي جيت بيدي کان بالغ ٿيڻ تائين 25 کان 30 ڏينھن وٺي ويندو آھي ان حوالي سان موسم جو عمل دخل پڻ ٿئي ٿو جنھن جي ڪري هن جي زندگي جو چڪر ڪڏهن وڌيڪ به ٿي ويندو آھي. هن ميلي بگ جو قسم سال ۾ مختلف دفعه نسل ڏيندي ڏٺو ويو آھي.

نقصان جون علامتون:

هن جيت جا جوان توڙي بالغ ٻوٽي جي تقريبن هر حصي کي نقصان پھچائيندا آهن جن ۾ ٻوٽي جا ڪچا گونچ، گل، پنکڙيون ۽ گوگڙا وغيره اچي وڃن ٿا. هي جيت ٻوٽي جي رس چوسي ان کي ڪمزور ڪري ڇڏيندو آھي جنھن ڪري هن جي شديد نقصان جي ڪري سڄو ٻوٽو سڪي ويندو آھي ۽ ٻوٽي جا گل، پن ۽ گوگڙا ڇڻي پوندا آهن. هي جيت ماڪي نم ٻوٽي جي پنن تي رس ڇڏيندو آھي جنھن جي ڪري پنن تي ڪاري سيور جي بيماري اچي وڃي ٿي ۽ ان عمل جي ڪري ٻوٽو سڄ جي روشني مان گھربل کاڌو حاصل ڪري نه سگھندو آھي ۽ اهڙي ريت سڄو ٻوٽو سڪي ختم ٿي ويندو آھي.

ميلي بگ جيت جا طفيلي / شڪار ڪندڙ جيت:

شڪار ڪندڙ جيت:

هن جيت کي ضابطي ۾ آڻڻ لاءِ دنيا ۾ 13 قسمن جا شڪاري جيت موجود آهن جن ۾ اڪثر ڪري ٽنڊيئون جهڙوڪ پتن واري ٽنڊي، تپڪن واري ٽنڊي ۽ ڊگھن پتن واريون ٽنڊيئون اچي وڃن ٿيون. ان کان علاوه ڪرائسوپ ۽ ان جو جوان ٻچو واڳو نم فائيديمند جيت اچي وڃن ٿا. هنن شڪاري جيتن ۾ ڊگھن پتن واري ٽنڊي کي سڄو سال نمايه ڏٺو ويندو آھي.

طفيلي جيت:

هن جيت کي عام طور تي ڪاري ڏينپو جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو جنھن کي انگريزي ۾ ايناشئس جي نالي سان پڻ سڃاتو ويندو آھي. هن جيت کي ميلي بگ تي سنو ضابطو ڪندي ڏٺو ويو آھي ۽ هي جيت ميلي بگ جي نسل کي وڌڻ کان تمام سٺي نموني روڪي ٿو.

ميلي بگ جيت جو تدارڪ ڪرڻ لاءِ ڇا ڪيو ويندو.

هن منصوبي جو مقصد اهو آھي ته جامع حڪمت عمليين ۽ حياتياتي ضابطن سان هن جيت جو ضابطو آندو وڃي جيڪو هنن طريقن سان ڪيو ويندو.

نقصان رسيل پنن کي گڏ ڪري نيفر تي موجود پيتين ۾ رکيو ويندو ته جيئن شڪاري ۽ طفيلي جيتن لاءِ آساني ٿئي ۽ اهي ميزبان جيت (ميلي بگ) کي آساني سان حملو ڪري سگھن.

ميلي بگ جي مهندي نما کولن کي الڳ ڪري برئين ۾ وجهي رکڻ ته جيئن وڌيڪ شڪاري ۽ طفيلي جيتن جي پيدائش ٿئي.

فائيديمند جيت خود به خود ڦهلجڻ شروع ٿين ۽ آس پاس ۾ پکيڙجي وڃن.

هزارن جي تعداد ۾ فائيديمند جيت پيدا ڪرڻ ته جيئن اهي خود به خود پري پري تائين پکيڙجي وڃن. ان کان علاوه اهي جيت نيفر تي گڏ ڪري پري وارن زميندارن کي مهيا ڪجن ته جيئن اهي پڻ فائدو حاصل ڪري سگھن.



برسات جي موسم ۾ وونئڻ جي حفاظت

ڊاڪٽر شاهه نواز کهڙو

ڊپارٽمينٽ آف اينٽامالاجي،
شهيد ذوالفقار علي ڀٽو زرعي ڪاليج ڏوڪري
سنڌ زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام
snkhuhro@gmail.com

اسان جو ملڪ پاڪستان دنيا ۾ چوٿون وڏو ملڪ آهي جيڪو وونئڻ جي پيداوار حاصل ڪري ٿو.

وونئڻ جي فصل مان نمندار شيون پاڪستان مان ٻين ملڪن ۾ ايڪسپورٽ ڪري 55% ٻاهريون ملڪي ٺاڻو ڪمائي ڏئي ٿو. وونئڻ جو فصل گهڻي ايراضي تي اٽڪل پنجاب ۾ 75% ۽ سنڌ صوبي ۾ اٽڪل 26% فصل پوکيو وڃي ٿو سنڌ ۾ وونئڻ جو فصل اڪثر مارچ ۽ اپريل ۾ پوکيو وڃي ٿو ۽ پنجاب ۾ مئي ۽ جون ۾ پوکيو ويندو آهي سنڌ صوبي جو فصل جون ۾ پيداوار ڏيڻ شروع ڪندو آهي ۽ ڦٽي مارڪيٽ ۾ به اچي ويندو آهي. سنڌ ۾ وونئڻ جو فصل هيٺين سنڌ ۾ مارچ ۽ اپريل ۾ پوکيو ويندو آهي ۽ جڏهن ته اتر سنڌ يا مٿيون حصو سنڌ جو وونئڻ مئي ۽ جون ۾ پوکيو ويندو آهي جنهن جي پيداوار جولاءِ ۽ آگسٽ ۾ مارڪيٽ ۾ ايندي آهي.

جڏهن اسان جو فصل تيار ٿيڻ جي ويجهو هوندو آهي يا تيار ٿي ويندو آهي ته برساتن جو سلسلو وقت به وقت شروع ٿي ويندو آهي جيڪو فصل کي پڻ نقصان پهچائيندو آهي. شروعاتي برسات جيڪا هلڪي هلڪي پوندي آهي برسات جو اهو پاڻي جتي پاڻي جي کوٽ هوندي آهي اتي اهو پاڻي فصل کي فائدو پهچائيندو آهي. پر جتي پاڻي گهڻي مقدار ۾ هوندو آهي ته اتي اهو پاڻي فصل کي نقصان پهچائيندو آهي ڇو ته وونئڻ جي فصل کي پاڻي جي ضرورت گهڻي مقدار ۾ نه هوندي آهي. جڏهن اهو فصل سڪندو آهي ته آبادگار کي ان فصل مان فورن پاڻي ٻاهر ڪڍڻ جا جلدي اپاءَ وٺڻ گهرجن ته فصل کي نقصان ٿيندو آهي.

جڏهن موسمياتي برساتون شروع ٿين ٿيون ته اهي وونئڻ جي فصل کي تمام گهڻو نقصان ڏين ٿيون ڇو ته فصل ان وقت تيار هوندو آهي جڏهن جو پاڻي فصل ۾ تمام گهڻو بيهجي ويندو آهي ته اهو بيٺل فصل لاءِ تمام گهڻو نقصانڪار هوندو آهي. ان بيٺل يا

برسات جي پاڻي کي ٻاهر ڪڍڻ لاءِ آبادگار کي پاڻ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. ان برسات جي پاڻي کي فصل ۾ 24 يا 48 ڪلاڪ فصل ۾ بيهڻ نه ڏجي ڇو جو اهو فصل جي پاڙ کي پاڻي نقصان ڏئي فصل کي ساڙي ڇڏيندو آهي. ۽ آبادگار جو گهڻو نقصان ٿيندو آهي.

جڏهن فصل گل ٻاڻي تي هوندو آهي ته گهڻي هوا جي لڳڻ سان گل ٻاڻي کي نقصان ٿيندو آهي ۽ اها گهڻي تعداد ۾ ڇاڻو ڪندي آهي. انهيءَ لاءِ آبادگار کي گهڻو موسمياتي تبديلين جو جائزو وٺڻ گهرجي يا وري زراعت جي آفيسرن سان مسلسل رابطي ۾ رهڻ گهرجي ان کان علاوه فصل کي پاڻي وقت تي ڏجي ۽ فصل کي سوڪمڙو ٿيڻ نه ڏجي ته جيئن گل ٻاڻيءَ کي گهڻو نقصان به نه ٿئي. ان کان علاوه فصل کي سفارش ٿيل پاڻي وقت تي ڏجي ته جيئن گل ٻاڻي صحتمند رهي. انهي آبادگار کي برسات جي پاڻي کان بچڻ لاءِ ان کي ٽيڪنيڪل مئنيجمينٽ ڪراڻي پوندي جنهن ۾ آبادگار کي فصل برسات جي نقصانات کان بچائڻو پوندو. انهي لاءِ آبادگار کي وونئڻ جي فصل جي چوٽي تي لڳائڻو پوندو جنهن کي (Bed Furrow Irrigation System) چئبو آهي. جنهن ۾ برسات جو پاڻي وونئڻ جي ٻوٽي کي نقصان نه ڏيندو آهي ۽ برسات جو پاڻي آساني سان نڪري ويندو آهي يا وري آبادگار انهي پاڻي کي آساني سان نيڪال ڪري سگهي ٿو. جڏهن ته وونئڻ جو فصل گوگڙو (Boll) جملي ٿو. ۽ ڦٽي گوگڙو مان نڪرڻ شروع ٿئي ٿي ۽ وري جڏهن برسات ٿيندي آهي ته اها ان ڦٽيءَ کي نقصان ڏئي ٿي. ۽ پوءِ ڦٽي جو معيار Quality خراب ٿيڻ شروع ٿئي ٿي ۽ ان تي ڊاگ لڳڻ شروع ٿيندا آهن. جنهن جي ڪري اها مارڪيٽ ۾ سٺي ريت سان نه وڪامندي آهن ۽ آبادگار کي نقصان ٿيندو آهي. ۽ اها جڏهن ٽيڪسٽائل مل ڏي ويندي آهي ته واپاري ان کي گهٽ معيار واري ڪپهه ڪري ڪٽندا آهن.

انهي لاءِ آبادگارن کي حڪومتي سفارش ڪيل حڪمت عملي تي هلائڻ گهرجي ۽ برسات جي پاڻي کي جلد کان جلد ٻاهر ڪڍي ڇڏجي. پاڻي کي نيڪال ڪرڻ جي لاءِ زمين جي چوڌاري وڏا کڏا کڏي ڇڏجن ته جيئن برسات جو پاڻي ڪرن مان نيڪال ٿي انهن کڏن ۾ پوي يا وري اگر ڪو وڏو تلاءُ هجي ته اهو ان ۾ نيڪال ڪجي جيئن فصل کي نقصان کان بچائي سگهيو ۽ گهڻي پيداوار حاصل ڪري سگهجي جنهن مان آبادگار ۽ ملڪ جي معيشت کي فائدو ٿئي.



ميهن جي پوک

آڪاش پنهور

ڊپارٽمينٽ آف پلانٽ پروٽيڪشن

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

pahnwarakash5@gmail.com

• پوکيءَ جو وقت: ميهن جو فصل سال م به پيرا پوکيو وڃي
ٿو جن مان پهريون فصل فيبروري مارچ م ۽ ٻيو جولاءِ آگسٽ م
پوکيو وڃي ٿو.

• پوکيءَ جو طريقو: پوکيءَ کان اڳ جڏهن ڪريا ٺاهجن ته
انهن م DAP يا NPK پاڻ جي هڪ ٻوري وڃي ڪريا 5 کان
6 فوٽ ويڪرا ٺاهجن جن جي ٻنهي پاسن کان 6 انچن جي
مفاصلي تي چنگيون هڻجن هر چنگي ۾ ٻن کان ٽي بچ جا
ڌاڻا وڃي پوري چڙڻ گهرجن. بچ ڦٽي تيار ٿئي ته انجو
صحتمند سلو چڙي باقي پٽي چڙجي مطلب ته ٻوٽن جي
چنڊائي ڪجي ته جيئن ٻوٽن کي روشنائي ۽ هوا جو مناسب
گذر ملي سگهي.

• ڪيميائي پاڻ جو استعمال: DAP يا NPK هڪ ٻوري
پوکيءَ وقت باقي گل ٻاڻي تي پهچي ته يوريا جي هڪ ٻوري في
ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

• گند گاه: فصل م غير ضروري گند گاه جي خاتمي لاءِ گڏ
ڪيڙ گهرجي جنهن سان زمين نرم رهندي ۽ جيئن بيمارين جو
حملو گهٽو نه ٿيندو

• پاڻي: پهريون پاڻي بچ
پوکڻ جي هڪدم بعد ڏجي
جڏهن ته باقي پاڻي هر هفتي ڏيڍ
جي وقفي سان يا فصل جي
گهرج مطابق ڏجي.

• جيت:

• ميو جي مک Fruit

Fly: ڊپٽريڪس ML 400 في ايڪڙ.

• جون Mite: اوبيران ML 100 يا پائريڊين 200 سي

سي يا پولو ML 200 في ايڪڙ.

• گاڙهي ننڍڙي: ڪراتي 60 سي سي يا اڪٽارا 24

گرام يا اميدا 60 سي سي في ايڪڙ.

• پنداوار: ميهن جي فصل تي سني محنت ڪيل فصل

مان في ايڪڙ 100 کان 120 مٺ تائين پنداوار حاصل ڪري

سگهجي ٿي.

اونماري جي آڳاٽي پوکي گهڻو ڪري جنوري ۽ فيبروري
کان شروع ٿي ويندي آهي آڳاٽي پاڇين جي پوکي سان پاڇيون
مارڪيٽ م سٺو اگه ڪنديون آهن سنڌ جي ڏاکڻي حصي م
هي فصل فيبروري ۾ شروع ٿيندي ٿي پوکيو وڃي ٿو جڏهن ته
اترئين حصي م 15 فيبروري کان پوکيو وڃي ٿو

• ميها Indian Squash

زمين جي چونڊ: ميهن جي پوکي لاءِ اهڙي زمين جي چونڊ

ڪجي جنهن ۾ پاڻي جي
نيڪال جي خاصيت موجود
هجي زرخيز چيڪي وارياسي
لتاسي ٻين جي پيٽ م بهتر پلي
زمين آهي آڳاٽو فصل وارياسي
زمين تي پوکجي ته بهتر آهي
چاڪاڻ اهڙين زمينن م درج
حرارت ٻين جي پيٽ م وڌيڪ
ٿئي ٿو جنهن سان بچ جو ڦوٽهڙو
وڌيڪ ۽ جلد ٿئي ٿو

• زمين جي تياري: ميهن جي پوکي لاءِ چونڊيل زمين کي هر
ڏئي پتر پوري زمين م گريل سڙيل وڻاڻ جي پاڻ جون 20 کان 25
گاڙيون في ايڪڙ وڃي ڏيسي هر وسيلي ملائڻ گهرجي جنهن
کان پوءِ هر ڏئي زمين کي هموار ڪجي

• بچ جو مقدار: ميهن جي پوکي لاءِ بچ 4 کان 5 ڪلو گرام
في ايڪڙ استعمال ڪجي بچ جي چونڊ ۽ ڪوالٽي جو اهم
معيار آهي جنهن سان سني پيداوار ملي ٿي ان لاءِ صحت مند ۽
بيمارين کان پاڪ بچ جي چونڊ ڪرڻ گهرجي.

2022ع جي برسات ۽ ڪجيءَ جي فصل کي پهچندڙ نقصان

ڊاڪٽر ممتاز علي ساند

چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف باٽني
شاھ عبداللطيف يونيورسٽي خيرپور
mumtazsaand@gmail.com

ڪاشف ڪريم قليو

ڊپارٽمينٽ آف باٽني
شاھ عبداللطيف يونيورسٽي خيرپور
kashifkarimphalio@gmail.com

جولاءِ 2022ع ۾ مون سون برسات جي پاڻي جي ڪري
ڪجين جي فصلن جو تمام گهڻو نقصان ٿيو. خيرپور شهر ۾

مختلف جڳهن تي
ويڃڻ بعد مون سون
جي برسات جي
ڪري تقريبن 0.5
کان 1 ميٽر تائين
ڪجين جي اسٽيم کي
برسات جي پاڻي سان
ڍڪيل ڏٺو. خيرپور
شهر ڪجين جي
ڪري تمام گهڻو
مشهور آهي. ۽ ڪجين
جي فصلن جي ڪري
خيرپور شهر جي

معيشت تمام گهڻي اڳتي رهي آهي. پر هن سال تمام تيز
بارش جي ڪري خيرپور ۾ باغ جي واپارين کي تمام گهڻو
نقصان پهتو آهي. خيرپور ضلعي جي ڪجين تي مون سون

برسات جي ڪري واپارين کي ٿيل نقصان تي هڪ تحقيق
دوران مختلف واپارين سان ڳالهه ٻوله ٿي، ڪجهه واپارين
جو چوڻ هو ته چوهارا ٺاهي رهيا آهيون. برسات ۽ سج جي
روشنِي گهٽ هجڻ جي ڪري ڪجين جي باغن ۾ ڏنگ نه ٿيا
آهن. ۽ موجوده صورتحال کي ڏسندي انهن جو چوڻ هو ته
60% نقصان ۾ آهيون ۽ ڪوشش ڪري رهيا آهيون ته
چوهارا جي رقم منڊي ۾ وڌائي ٿيل نقصان کي پورو
ڪيون. پر ٻن ڏينهن بعد وري برسات جي پاڻي سبب
چوهارا ۽ ڪارڪن خراب ٿيندي نظر آيا، ۽ ڪٿي ته باغ ۾
ڏوڪا خراب ٿيندي نظر آيا. انهن باغن جي واپارين سان
ڳالهه ٻوله ٿيندي خبر پئي ته ڏوڪا اڃا رسيا ئي نه هيا ته
بارش شروع ٿي وئي ۽ وڌيڪ انهن جو چوڻ هو ته اڃا باغ ۾
ڏوڪن ۾ ڪوڪري نه ٿي آهي. ۽ لڳاتار هلندڙ بارش جي
ڪري ڪجهه ڪجين ۾ ڏوڪا ڦاٽي پيا، ڪجهه گوشن مان
ڪري پيا ۽ ڪجهه تي گهم جي ڪري فنگس اٿيڪ ڪري
ڏنو. هاڻي چوهارا به ٺاهي نه ٿا سگهون. ۽ ڪجهه جڳهن تي
هن سال ۾ ڪجين جي باغ ۾ واپارين کي ٿيندڙ نقصان ۽ مون
سون جي برسات کي مدنظر رکندي نئين مان واپار ڪندڙ ۽
واپار جو شوق رکندڙ توبه ڪندي نظر آيا. ڪجهه واپارين
جو چوڻ هو ته پهرين دفعا ڪجين جي باغ جو واپار ڪري
رهيا هياسين، پر

هن پهرين ئي
واري نقصان
ڏسي رهيا
آهيون. ۽ آئينده
ڪجين جي باغ
جو واپار نه
ڪنداسين.

مون سون
بارش جو
خيرپور ضلعي ۾
ڊيٽ پالم فروٽ
جي خراب ٿيڻ،

مون سون بارش جو خيرپور ضلعي ۾ ڊيٽ پالم فروٽ جي خراب
ٿيڻ، واپارين کي پيل نقصان ۽ ان جي بچاءَ جي سلسلي ۾ ڪيل تحقيق
دوران خبر پئي ته تازه ڪجورن جي اسڪن تمام گهڻي سنهي ٿيندي
آهي، جيڪا آساني سان ڦاٽي سگهي ٿي ۽ بارش پوڻ کان بعد ڊيٽ
پالم جو روت سسٽم وڌيڪ پاڻي جذب ڪرڻ شروع ڪري ٿو. روت
سسٽم وڌيڪ پاڻي جذب ڪرڻ کان بعد ان پاڻي کي ڊيٽ پالم جي
فروٽ ڏانهن وٺي وڃي ٿو. ۽ ڪجور جي اسڪن سنهي هجڻ جي ڪري
ڪجور جي اسڪن ڦاٽي پوي ٿي ۽ اگر هڪ دفعو ڪجور جي اسڪن ڦاٽي
ته ڪجورسٽڙ لڳندا آهن ۽ زمين تي ڪري پوندا آهن.

واپارين کي پيل نقصان ۽ ان جي بچاءَ جي سلسلي ۾ ڪيل
تحقيق دوران خبر پئي ته تازه ڪجورن جي اسڪن تمام
گهڻي سنهي ٿيندي آهي، جيڪا آساني سان ڦاٽي سگهي

ٿي ۽ بارش پوڻ کان بعد ڊيٽ پالم جو روت سسٽم وڌيڪ پاڻي جذب ڪرڻ شروع ڪري ٿو. روت سسٽم وڌيڪ پاڻي جذب ڪرڻ کان بعد ان پاڻي کي ڊيٽ پالم جي فروٽ ڏانهن وٺي وڃي ٿو. ۽ ڪجور جي اسڪن سنهي هجڻ جي ڪري ڪجور جي اسڪن ڦاٽي پوي ٿي ۽ اگر هڪ دفعو ڪجور جي اسڪن ڦاٽي ته ڪجور سٽڻ لڳندا آهن ۽ زمين تي ڪري پوندا آهن. خيرپور شهر ۾ لڳاتار برسات سبب واپارين کي

الاهي نقصان پهتو آهي، پر جن احتياطي اپاء ورتا جهڙوڪ ڪڇي جي گوشن کي حفاظتي بيگس سان ڍڪڻ، ته اهي گهڻي نقصان کان بچي ويا.

نوٽ: خيرپور ۾ مون سون جي برسات سبب ڪجن جي فصلن جو تباه ٿيندڙ منظر هيٺ ڏنل تصويرن ۾ آساني سان ڏسي سگهجي ٿو.

تجويزون

(Recommendation) ۽ صلاحون:

- واپارين کي پيل نقصان کي مدنظر رکندي صلاح ڏجي ٿي ته آئينده ارلي (early) هارويست جهڙوڪ: گجر، ڪاشواري يا ليت هارويست جهڙوڪ

ڍڪي پوکڻ ته جيئن مون سون بارش کان پمريان يا بعد ۾ ڏنگ ٿين جيئن واپاري ٿيندڙ مون سون بارش ۾ نقصان کان بچي سگهن.

- خيرپور ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ کي گهرجي ته سروي ڪري نقصان ۾ پيل آبادگارن کي رليف ڏي.

- سنڌ گورنمينٽ کي گهرجي ته ڪجن جي باغ جو واپار ڪندڙن کي پيل نقصان جي تحقيق ڪري انهن کي ڦل

رقم ڏئي وڃي يا ته 50% نقصان جي رقم ڏئي وڃي جيئن واپاري جنهن جو گذر سفر ڪجن جي باغن تي آهي سي پنهنجو گذر سفر آساني سان ڪري سگهن.

- فيڊرل گورنمينٽ کي گهرجي ته هڪ ٽيم تيار ڪن جيڪا مون سون برسات ۾ سروي ڪري ته خيرپور ضلعي ۾ مستحق واپارين کي جن کي ڪڇي جي واپار مان نقصان پيو آهي. انهن کي رليف ڏي ۽ هڪ سال لاءِ بنا وياج جي انهن کي قرض ڏئي ته

خيرپور ضلعي جي ڪجين تي مون سون برسات جي ڪري واپارين کي ٿيل نقصان تي هڪ تحقيق دوران مختلف واپارين سان ڳالهه ٻوله ٿي، ڪجهه واپارين جو چوڻ هو ته چوهارا ٺاهي رهيا آهيون. برسات ۽ سج جي روشني گهٽ هجڻ جي ڪري ڪجين جي باغن ۾ ڏنگ نه ٿيا آهن. ۽ موجوده صورتحال کي ڏسندي انهن جو چوڻ هو ته 60% نقصان ۾ آهيون ۽ ڪوشش ڪري رهيا آهيون ته چوهاري جي رقم منڊي ۾ وڌائي ٿيل نقصان کي پورو ڪيون. پر ٻن ڏينهن بعد وري برسات جي پاڻي سبب چوهارا ۽ ڪارڪون خراب ٿيندي نظر آيا، ۽ ڪٿي ته باغ ۾ ڏوڪا خراب ٿيندي نظر آيا. انهن باغن جي واپارين سان ڳالهه ٻوله ٿيندي خبر پئي ته ڏوڪا اڃا رسيا ئي نه هيا ته بارش شروع ٿي وئي ۽ وڌيڪ انهن جو چوڻ هو ته اڃا باغ ۾ ڏوڪن ۾ ڪوڪري نه ٿي آهي. ۽ لڳاتار هلندڙ بارش جي ڪري ڪجهه ڪجين ۾ ڏوڪا ڦاٽي پيا، ڪجهه گوشن مان ڪري پيا ۽ ڪجهه تي گهم جي ڪري فنگس اٿيڪ ڪري ڏنو. هاڻي چوهارا به ٺاهي نه ٿا سگهون.

• Researchers

کي گهرجي ته اهي ليپ ۾ هڪ ڊيٽ پالم جي ويراڻي (Variety) متعارف ڪرائن جيڪا رين ريزسٽنٽ هجي،

جيئن ان جو ميوو بارش ۾ خراب نه ٿئي. يا ڊيٽ پالم جي جين ۾ جينيٽڪ انجنيئرنگ جي مدد سان تبديلي آڻي ڊيٽ پالم جو اهو ٻوٽو متعارف ڪرائن جيڪو جلد ميجوئر ٿي ميوو ڏئي ۽ سائز ۾ ننڍو هجي جيئن اهو آساني سان گرین هائوس ۾ پوکي سگهجي ته جيئن اهو مون سون جي بارش کان بچي سگهي.



برسات، زراعت ۽ اضافي پاڻي جو نيڪال!

پروفيسر محمد مثل جسڪاڻي

ڊپارٽمينٽ آف پلانٽ پيٿالاجي

سنڌ زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام

mithaljiskani@yahoo.com

تازين برساتن جي ڪري زرعي صورتحال ڳڻتي جوڳي آهي. زراعت وسيلي گذر سفر ڪندڙ پریشان آهن. ان ڪري جيترو به ممڪن ٿي سگهي، جان حاصل ڪجي. جيڪا به معلومات هجي، ٻين سان ونڊ ڪجي. جيڪو ڪجهه به ڪجي، سوچي سمجهي ڪجي. سچ اهو آهي ته برسات جي ڪري وونت، ڪڇي، مرچ، تماٽو، ولين وارين پاجين کي شديد نقصان سبب آبادگارن جي واهر لاءِ خاص رعايتي ۽ مالي امداد جو عملي اعلان ٿيڻ گهرجي. آبادگارن کي ڪي خاص رعايتون ڏيڻ گهرجن. ڇو ته بچ ۽ پاڻ ته تمام گهڻا مهانگا آهن، ٻيا خرچ به برسات ٻوڙي لوڙهي ڇڏيا آهن. ننڍا آبادگار گهڻا متاثر ٿيا آهن. صورتحال کي سمجهڻ لاءِ مون فيس بوڪ تي ”سروي سوال“ جي عنوان هيٺ لکيو ”ننڍي هوندي کان ڪجهه سال اڳ تائين، برسات جو پاڻي گهرن مان نيڪال ڪرڻ ڏٺو فصلن مان جيڪڏهن ڪير پاڻي نيڪال ڪندو به هو ته اهو ذهن ۾ ضرور رکندو هو ته نيڪال ٿيندڙ پاڻي ڪنهن جو گهر يا ڪنهن ٻئي جو فصل ته نه ٻوڙيندو... اڄ ڪلهه برسات جو پاڻي نيڪال ڪرڻ وارو عمل اوهان ڪيئن ڏسو محسوس ڪريو ۽ سمجهو ٿا؟“

پڇيل سوال کي اٽڪل پنجاهه لائڪ مليا، جواب چند مليا! ماستر شبير محمد پنهور لکيو ”بلڪل سائين. پر سائين هن دور ۾ ڏسون ته پاڻي جي نيڪال جا قدرتي رستا به ختم ٿي ويا آهن. جنهن ڪري وڌيڪ نقصان ٿئي پيو.“ ڊاڪٽر فتح محمد ڪانهر لکيو: ”پنهنجي گهر جو گند ٻئي جي در تي يا گهٽي ۾ اچائي ٿا ڇڏيون، برسات جي پاڻي جو به نيڪال ائين آهي. روبا الله منهنجي پيءُ باقي ٻيا پاڻ ڄاڻن. پوري عال جو خير الله کان ڪير ائين نه ٿو گهري.“ عبدالله جروار لکيو ”سائين. اڄڪلهه ٻيو ٽرينڊ هلي پيو آهي. ته برسات وسندي ٿي پنهنجي فصل مان پاڻي ڪڍي ڇڏيو. باقي ڪنهن جو فصل ٻڏي يا تري ان سان ڪم ڪونهي.“ علي محمد لغاري لکيو ”سائين، هڪ ڏاڍو مڙس ۽ ٻيو بدڪردار ۽ ويڙهو گهراڻو

ٻئي ڪردار ڳوٺن لاءِ آزار آهن. سندن شڪار اڪثر شريف، امن پسند ۽ عزتدار ڳوٺاڻو هوندو آهي. جيڪي ڳوٺن ۾ برسات جي پاڻي جو لنگهه ۽ گهرن جي گندي پاڻي جا مقرر ٿيل کڏ ۾ نيڪال لاءِ لنگهه بند ڪريو ڇڏين ۽ ڪولڻ به نٿا ڏين. برسات جو پاڻي ٻين جي گهرن ڏانهن موڙيو ڇڏين. ڏاڍا مڙس پر بدڪردار ۽ مغرور پاڻ کان هيٺن ۽ امن پسند شريف ڪاتيدارن جي ٻني ڏانهن، پنهنجي ٻنين مان برسات جو پاڻي نيڪال ڪرايو ڇڏين. اهو ڪم ڏينهن جو نه ٿي سگهيو ته رات جو سانجهي مهل وانا موڪلي، اهو ڪم ڪرائي ڇڏيندو. پوءِ ڀلي هيٺي جو فصل ٻڏي وڃي ته هيٺو ڇا ڪندو؟ پاڙي جا گندا ماڻهو ۽ سندن جهيڙو ڪار زالون ۽ ڌيئرون ڏاڍي کان وٺي ويندا، پر پاڙي ۾ شريف پاڙيسرين لاءِ آزار هوندا آهن. اهي ساڳي گهٽي ۾ گهر سان گهر مليل پاڙيسري جي دروازي اڳيان گند اچليندا، ارورڙي ٺاهڻ جي ڪوشش ڪندا. امام بارگاه جي در اڳيان اروڙيون ٺاهي لنگهه به بند ڪري ڇڏيندا. گهڻيون به سوڙهيون ڪري ڇڏيون اٿن. برسات جو پاڻي به ٻين جي گهرن ڏانهن موڙيو ڇڏين. برسات جي پاڻي جو متبادل لنگهه کوٽائڻ ۾ وري مدد به نٿا ڪرائين. ته ڀلي عزتدار ۽ امن پسند ڳوٺاڻو سورن ۾ ٻيو لوڙي ۽ تماشين وري تماشو پيا ڏسندا.“

محبوب رضا راهو لکيو ”اڄڪلهه پاڻي نيڪال تي جهيڙا ڏاڍا ٿا ٿين هر ڪو پنهنجو بچاءُ چاهي ٿو ٻيو ڀلي ٻڏي.“ عبدالحميد جسڪاڻي تعلقي ميهڙ مان لکيو ”پنهنجي ٻني ۾ ته اڃا پاڻي نه پهتو آهي، سواءِ برسات جي، پاڻي ڪاڏهون ڪڍيو؟“ ۽ هن لکيو ”هوڏانهن پناهه گاه واري ديوار گهر به ڊهي پيو.“ حڪيم ميرجت لکيو ”اهڙن معاملن ۾ قوم ترقي ڪري پئي.“ اقبال جمالي لکيو ”اسان ننڍپڻ ۾ ڏٺو سين ته برسات جو پاڻي فصلن کان نيڪال ڪري ڏين ڍورن ۾ چوڙ ڪيو ويندو هيو جيئن ڪنهن جي فصل کي ڪو نقصان نه رسي باقي اڄ ڪلهه اوهين خوب ڄاڻو پيا.“ برسات جي ڪري ڳڻتي جوڳي صورتحال آهي، انيڪ سوال آهن، جيڪي روزاني هڪ ٻئي کان پڇيا وڃن پيا، ته پنهنجي مطالعي، مشاهدي، يادگيري ۽ تجربي مطابق جواب به ڏنا پيا وڃن.

شروع ٿيل برساتون اڃان هلن پيون، ريگستاني ۽ ڪوهستاني علائقن ۾ ته ڀلي ٿوري ٿوري وقفي سان برساتون وسنديون رهن، پر زرعي ميداني پتن، ڳوٺن ۽ شهرن جي صورتحال ڳڻتي جوڳي آهي. اضافي پاڻي جو نيڪال وڏو مسئلو بڻيل آهي. هاڻي ته شايد ئي ڪو اهڙو فصل هجي، جيڪو برسات سبب متاثر نه ٿيو هجي! صورتحال جي پيش نظر سوالن جوابن جي نه لفظي بحثن جي نه خاص حڪمت عملي جي ضرورت آهي.

برسات کانپوءِ فصلن جي بچاءُ جي حڪمت عملي

ابرار احمد مجيد اڻو

زرعي توسيع، تندو الهيار
abramajeedano@gmail.com

سڄي سنڌ ۾ برسات کانپوءِ ٻوڏ واري صورتحال آهي. اهڙي صورتحال ۾ برسات جو پاڻي نيڪال ڪرڻ هڪ اهم چيلينج بڻيل آهي. بحرال سنڌ جي زمينن کي بحال ٿيڻ ۾ وقت لڳندو. ۾ مختلف ضلعن ۾ مختلف جاين تي زمينون بحال ٿيڻ جو سلسلو شروع ٿيندو. اهڙين حالتن ۾ موسم پٽاندر ۽ زميني حالتن کي نظر ۾ رکندي پنهنجي زمين کي بحال ڪرڻ جون ڪوششون ڪرڻ گهرجن. تجربن ۽ تحقيقي رپورٽن مطابق برسات جي بيٺل پاڻي جو 24 ڪلاڪن اندر نيڪال ڪرڻ گهرجي، ان کانپوءِ بيٺل پاڻي جي نقصان جا اثر شروع ٿي وڃن ٿا ۽ آهستي آهستي نقصان وڌڻ شروع ٿي وڃي ٿو. فصل جون پاڙون ڳرڻ سڙڻ شروع ٿين ٿيون. کاڌ خوراڪ جو عمل متاثر ٿئي ٿو ۽ فصل دٻاءُ (Stress) ۾ اچي وڃي ٿو. اهڙي طرح ٻوٽو/فصل مرجھائڻ شروع ٿئي ٿو ۽ آخرڪار سڪي سڙي ختم ٿي وڃي ٿو. اهڙين حالتن ۾ ٻوٽي جي سڙڻ، سڪڻ دوران بيمارين جو حملو به وڌي وڃي ٿو. جنهن سان پڻ فصل متاثر ٿئي ٿو.

آبادگار پائرن لاءِ صلاح مشورا

ووڻن:

موجوده برساتن ۾ ووڻن جو فصل تمام گهڻو متاثر ٿيو آهي. جتي ٿورو گهڻو بچڻ جي اميد آهي، ڪوشش ڪري بيٺل پاڻي جو هيٺيائين وارين ايراضين ۾ نيڪال ڪري بچائجي. ان لاءِ حالتن مطابق سمورا وسيلو ڪتب ۾ آڻجن. برسات ۾ فصل جي تيار گل ٻاٽي چڻي خراب ٿي وئي آهي، ڪٽي وري گوگڙن جو ڪارو ٿيڻ، گلابي ڪيئن جو حملو به نظر آيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ برسات کانپوءِ فوري طور زرعي ماهرن جي صلاح مشوري سان ضابطو آڻجي.

ساريون:

ساريال ايراضين ۾ ٻوڏ واري صورتحال آهي. جتي ڪجهه ٽڪرا بچيا آهن، انهن کي بحال ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ

گهرجي. برسات جو پاڻي نيڪال ڪجي، ان کان پوءِ نئون نهري پاڻي ڏجي.

ڪمند:

ڪمند جي فصل کي برساتي ٻوڏ ۾ نقصان ٿيو آهي. ڪجهه ايراضين ۾ ڪمند جي فصل کي فائدو به ٿيو آهي. برساتن جي بيٺل پاڻي کي نيڪال ڪجي. ان کانپوءِ هلڪو نهري پاڻي ڏجي.

انڊ: انڊ جي باغن مان برسات جو بيٺل پاڻي نيڪال ڪجي. ٿڌن کي مٽي جي دڪا ٻڌجن جيئن ٿڌن کي بيٺل پاڻي متاثر نه ڪري سگهي. وڻن جي چانگ ۽ صفائي ڪجي.

ڪيلو:

برسات ۾ ڪيلي جي فصل کي نقصان پهتو آهي. برسات جو پاڻي گهڻو عرصو بيٺل ڪري ڪيلي جي ڦرين/چڱن جي جسامت کي نقصان پهتو آهي. عام طور تي فصل مان بيٺل پاڻي جو نيڪال ڪري فصل کي بحال ڪري سگهجي ٿو.

مرچ، بصر ۽ ٿماتا:

برسات ۾ پاڇين کي تمام گهڻو نقصان پهتو آهي. مرچن جو فصل برسات ۾ ٻڏي ختم ٿي ويو آهي. اهڙي طرح ٿماتن جي فصل کي به تمام گهڻو نقصان ٿيو آهي. اسان جا آبادگار پائر بچيل بصرن جي فصل تي تمام گهڻو ڌيان ڏين پيا. هن وقت برسات کان پوءِ بيمارين جهڙوڪ، پرپل بلاچ، جاريڊار سينور (Downy mildew)، سوڪهڙو ۽ جيتن ۾ ٿرڙو نظر آيا آهن. انهن کان بچاءُ لاءِ فوري طور حد جي زرعي ماهرن سان رابطو ڪرڻ گهرجي.

پينڊي:

برسات ۾ پينڊي جو فصل ٻڏي ختم ٿي ويو آهي. ڪٽي ڪٽي ٿورا ٽڪر بچيا آهن. انهن مان برسات جو پاڻي نيڪال ڪري، تيار پينڊيون پتي مارڪيٽ موڪلجن.

ولين واريون پاڇيون:

ميه، توري، ڪڍو، ڪريلو، ونگو چانهين ۽ گدرن کي تمام گهڻو نقصان ٿيو آهي.

ڪڇي:

هن سان ڪڇي جو سمورو فصل تباهه ٿي ويو آهي، جنهنڪري آبادگارن ۽ زرعي معيشت کي ڪروڙين روپين جو نقصان ٿيو آهي.



آگست مهيني ۾ برسات کان فصلن کي بچائڻ

ڊاڪٽر لياقت علي پٽو

زرعي تحقيقاتي سينٽر، ٽنڊو ڄام
l.bhutto@gmail.com

سندھ اندر وڌيڪ برساتن پوڻ ڪري گهڻي ايراضي تي فصلن کي نقصان رسيو آهي ان صورت ۾ بچيل فصلن کي نقصان کان بچاءَ لاءِ احتياطي تدبيرن تي عمل ڪري آبادگار پنهنجن فصلن کي بچائي سگهن ٿا. وونٽن، ڪيلي ۽ پاڇين ۾ گهڻو وقت پاڻي بيهڻ نه ڏٺو وڃي، جنهن سان پاڙواريون بيماريون پيدا ٿين ٿيون. ان لاءِ جيترو جلد ئي سگهي فصل مان پاڻي نڪال ڪيو وڃي.

بصرن جي فصل ۾ برسات کان پوءِ ڊاٽوني ملڊيو بيماري جي وڌڻ جا امڪان آهن. ان لاءِ سفارش ڪيل زهر جو ڦوهارو ڪيو وڃي.

ڪمند ۾ برسات نقصان ڪار ڪونهي جيتري وڌيڪ برسات پوندي اوترو ئي ڪمند کي فائدو آهي. ڪجهه هيٺاهين وارا علائقا جتي ڪمند ۾ برسات جو پاڻي بيهي رهي ته ان جي نڪال جو بندو بست ڪرڻ گهرجي. برسات دوران هوائن جي ڪري ڪمند ڪري سگهي ٿو، جنهن جي ڪري ڪمند جي چوٽين کي ڪنهن به ڊگهين کانين سان ملائي رسي جي مدد سان ٻڌي سگهجي ٿو. ڪمند کي برسات جي دوران پاڻي نه ڏنو وڃي.

سارين جي پن ويڙهي ۽ اڇي پني واري مهلي جو حملو ٿي سگهي ٿو. ان کان بچاءَ لاءِ فرٽيرو 0.4 جي جو وزن 4 ڪلو گرام في ايڪڙ يا بيلٽ 48 ايس سي جو وزن 10 ملي ليٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي.

جيڪڏهن سارين جي ٻوٽي مٿان پڻ ويڙهيل ۽ سائو مادو ڪرچيل نظر اچي ۽ ٽڪرن ٽڪرن ۾ فصل دوهاننيل نظر اچي ته ڪراٽي 200 ملي ليٽر في ايڪڙ 100 ليٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. سارين جي فصل ۾ پينل پاڻي هڪدم نڪال ڪرڻ گهرجي. گهڻو پوري پاڻ استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي.

وونٽن جي فصل ۾ جيڪڏهن وڻن جو چانورو هجي ته وڻن جي چانگ ڪرڻ گهرجي. برسات جي ڪري گهم وڌي وڃي ٿي جنهن سان وونٽن تي سائي مهلي جو حملو وڌي وڃي ٿو ان لاءِ ضروري آهي ته فصل جو تفصيل سان معائنو ڪجي. ۽ هيٺ ڏنل ڪنهن به دوا جو ڦوهارو ڪجي. ناٽي پاڻ 250 ملي ليٽر في

ايڪڙ يا ڊائونٽو فيوران 100 گرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. برسات جي موسم ۾ اڇي مک جا بالغ مري ويندا آهن پر هنن جا ٻچا موجود هوندا آهن اهي وري بيضا ڏيندا آهن جيڪي پڻ گهم جي وڌڻ جي ڪري وڃن ٿا جنهن جو معائنو پڻ ڪيو رهجي ۽ وڌيڪ حملي جي صورت ۾ ٻيرو فيزن 500 گرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. برسات ۾ ٿرڙي جي حملي جي نمايان ڪمي اچي ٿي. ميلي بگ ڪانه گهٽجي پر برسات جي ڪري هڪ فصل کان ٻئي فصل تائين پهچڻ جي ڪري ميلي بگ جو حملو وڌي سگهي ٿو انڪري فصل جي جانچ پڙتال ڪندو رهجي ۽ حملي جي صورت ۾ دوا جو ڦوهارو ڪجي جتي ميلي بگ موجود هجي. ان لاءِ پروفينو فاس 800 ملي ليٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي.

وونٽن جي فصل ۾ برسات جي ڪري آمريڪن، چٽڪرو ۽ گلابي ڪيئون وڌي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته هنن جي واڌ ويجهه گهم وڌڻ ڪري وڌي وڃي ٿي ان جي تدارڪ لاءِ هنن دوائن مان ڪنهن به هڪ دوا جو ڦوهارو ڪريو. آمريڪي ڪيئن لاءِ بيلٽ 84 ايس سي 50 ملي ليٽر في ايڪڙ يا ريڊيڪنٽ 80 ڊبليو جي ڪي 80 ملي ليٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي. چٽڪري ڪيئن لاءِ ٽاسٽار 10 ايس سي 250 ملي ليٽر في ايڪڙ يا ڪراٽي 5 ايس سي 250 ملي ليٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي. جڏهن ته گلابي ڪيئن لاءِ ٽرائيزو فاس 500 ملي ليٽر في ايڪڙ يا پروڪسز ڪي 100 ملي ليٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي. چونڊي لاءِ تيار فصل مان چونڊو ڪري محفوظ جاءِ تي اسٽور ۾ رکڻ گهرجي. وونٽن جي فصل ۾ چونڊو هلندڙ برسات ۾ نه ڪرڻ گهرجي. برسات دوران فصل ۾ پاڻي ڏيڻ وارو واٽر ڪورس بند ڪيو وڃي. برسات دوران ڪنهن به دوا جو ڦوهارو نه ڪرڻ گهرجي، ان لاءِ جيترو جلد ئي سگهي فصل مان پاڻي نڪال ڪجي جيئن فصل کي بچائي سگهجي.

ترن جو فصل هيٺاهين واري ايراضي ۾ پوکيل هجي ته ان ۾ پاڻي کي بيهڻ نه ڏجي ۽ نڪال ڪري ڇڏجي ڇاڪاڻ ته هي فصل وڌيڪ پاڻي بيهڻ جي ڪري تمام نازڪ آهي ۽ وري جڏهن گرمي وڌي ٿي ته ٻوٽا سڙڻ شروع ڪن ٿا. پن مروڙ جيت جو حملو نظر اچي ته ان تي ڪراٽي زهر ڪي 200 ملي ليٽر في ايڪڙ جي حساب سان ڦوهارو ڪرڻ گهرجي.

اسٽورن ۾ رکيل ڪٽڪ تي جيتن جو حملو وڌيڪ ٿيندو آهي، ان لاءِ ضروري آهي ته اسٽورن کي مڪمل بند ڪري فيوميگيشن ڪرڻ گهرجي. اسٽور جي ماپ هر اسڪاٽر ميٽر 5 کان 10 ٽڪيون استعمال ڪرڻ گهرجن.

●

موسمي تبديلي جا زراعت تي اثر

غلام قادر منگريو

ايگريڪلچر آفيسر
زرعي توسيع کاتو ضلعو سانگهڙ

دنيا جي آبادي تمام تيزي سان وڌي رهي آهي، هڪ اندازي موجب 2050 تائين اضافي 2 ارب ماڻهو هن دنيا ۾ رهندا. جنهن جي لاءِ 60 سيڪڙو وڌيڪ خوراڪ جي ضرورت پوندي ٿي. پاسي اسان جي زراعت موسمي تبديلي جي شديد دٻاءُ هيٺ آهي. هن وقت به دنيا ۾ 793 ملين ماڻهو خوراڪ جي ڪمي جو شڪار آهن.

اسان جي ملڪ پاڪستان ۾ زراعت ڪرنگهي جي هڏي جي حيثيت رکي ٿي. هي شعبو 45 سيڪڙو ماڻهن کي روزگار مهيا ڪري ٿو. اسان جي جي-ڊي-پي ۾ زراعت جو حصو 21 سيڪڙو آهي ۽ اسان جي ملڪ جي برآمد ۾ زراعت 60 سيڪڙو حصو شامل ڪري ٿي. پاڪستان موسمي تبديلي جي ڪري وڌيڪ خطري ۾ آهي ۽ هن وقت ٻارهن نمبر وڌيڪ متاثر ٿيندڙ ملڪ آهي.

موسمي تبديلي جي ڪري پونڊڙ اثر

1. ڌرتي جو گرمي پد ڏيهون ڏينهن وڌڻ.
2. پاڻي جي شديد ڪوت.
3. خشڪ سالي ۽ ڏڪر.
4. ٻوڏون ۽ سيلاب.
5. زميني مٿاڇري جو تنهن يا زمين جو ڪٽاءُ.
6. بيلن، جهنگلن جو گهٽجڻ.
7. شديد گرمي ۽ شديد سردي جون لهرون اچڻ.
8. برساتن جي سلسلي ۾ تبديلي، اڻ منڊائون برساتون پوڻ.
9. مون سون برساتن ۾ تبديلي اچڻ.
10. سمر ۽ ڪلر جو وڌڻ.
11. پڪين، جانورن، ٻوٽن ۽ ٻين جاندارن جي نسلن جو نا

پيد ٿيڻ.

11. سامونڊي طوفانن ۾ اضافو ٿيڻ.

12. برفاني گليشيئير جو ختم ٿيڻ.

13. خطرناڪ بيمارين ۽ جيتن جي حملي آور ٿيڻ جهڙوڪ ماکڙ وغيره.

هڪ تحقيق موجب سنه 2040 تائين دنيا جو سراسري درجي حرارت 3 درجه وڌي ويندو ۽ هن صدي جي آخر تائين 5 کان 6 درجه گرمي وڌي ويندي جنهن سان ڪڻڪ جي پيداوار ۾ 50 سيڪڙو ۽ چانورن جي پيداوار ۾ 20 سيڪڙو تائين گهٽتائي اچي ويندي. ٻئي پاسي اسان جي آبادي ۾ 2 ارب اضافو ٿي ويندو جنهن جي لاءِ اضافي 60 سيڪڙو خوراڪ گهربل هوندي.

هي دنيا جي لاءِ هڪ وڏو چيلينج هوندو. هن چيلينج کي منهن ڏيڻ جي لاءِ اسان کي ڪلائيمٽ سمارٽ ايگريڪلچر کي اپنائڻو پوندو.

ڪلائيمٽ سمارٽ ايگريڪلچر جو مطلب ته اسان کي روايتي زراعت وارا طريقا ڇڏي ڪري اهڙا جديد طريقا، زرعي حڪمت عمليون ۽ بهتر منصوبا بندي اپنائيندي پوکي ڪرڻي پوندي جنهن سان اسان نه صرف موسمي تبديلي کي گهٽائي سگهون پر گڏوگڏ وڌيڪ پيداوار به حاصل ڪري سگهون. جنهن سان اسان دنيا جي وڌندڙ آبادي جي خوراڪي ضرورتن به پوريون ڪري سگهون.

ڪلائيمٽ سمارٽ ايگريڪلچر. هن طريقي جي زراعت لاءِ اسان کي گڏيل حڪمت عملي اپنائڻي پوندي. جڏهن سب آبادگار گڏجي هن طريقي تي عمل ڪندا ته پوءِ ئي اسان موسمي تبديلي کي منهن ڏيئي سگهون ٿا. ڪلائيمٽ سمارٽ ايگريڪلچر لاءِ اسان جي آبادگارن کي 04 مکيه اصولن تي عمل ڪرڻو پوندو.

1. زراعت ۾ مشينن جو گهٽ ۾ گهٽ استعمال ڪرڻ.

اڳي چوڻي هوندي هئي ته جيترو هر اوترو ڦر ڦر هارڻ جديد تحقيق موجب ڊيزل تي هلندڙ مشينن جهڙوڪ ٽريڪٽر جو استعمال گهٽ ۾ گهٽ ڪجي، جنهن سان ڊيزل جو استعمال گهٽجندو ۽ نتيجي ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس جو اخراج به گهٽ ٿيندو. مشين جي گهٽ استعمال ڪرڻ سان زمين جو مٽي ٽڪرو انوائرمينٽ به ڊسٽرب نه ٿيندو. جنهن سان زمين جي زرخيزي ۾ اضافو ٿيندو ۽ پوکي تي ايندڙ خرچ ۾ به گهٽتائي ٿيندي.

مثال طور زيرو ٽيليج وارو طريقو. هن طريقي ۾ سارين جي فصل کان خالي ٿيندڙ زمين ۾ هر هلائي زمين تيار ڪرڻ بدران

سان زمين جي زرخيزي بهتر ٿيندي ۽ نقصانڪار جيتن جي حملي ۾ به گهٽتائي ايندي.

4. فصلن سان گڏ باغن، هڙي يا ٻيلن جي پوکي ڪرڻ.

قدرتي ماحول کي برقرار رکڻ لاءِ ٻيلن ۽ باغن جي پوکائي به تمام ضروري آهي. ميون واري باغن جي پوکائي سان اسان کي ميون ملندو، جنهن سان خوراڪي گهٽتائي ۾ ڪمي ٿيندي، ان ميوي وارن باغن جي اندر ڀاڄيون ۽ گاه وارا فصل به آساني سان پوکي سگهجن ٿا. جنهن سان زمين جي بهتر ۽ متوازي استعمال ٿيندو. پاڻي جي کوٽ جي صورت ۾ به باغ وڌيڪ برداشت رکن ٿا.

زمين جي ڪجهه حصي تي ٻين جي هڙي جي پوک به ضرور ڪجي. هڙي جي پوک سان قدرتي ماحول کي متوازن رکڻ ۾ مدد ملندي، قدرتي آفتن کي گهٽائي سگهيو. پنجن سالن پوءِ نيڪ ٺاڪ آمدني به ٿيندي، ضرورت وقت مال لاءِ چارو پلڙو تاري، فرنيچر لاءِ ڪاٺ وغيره به آساني سان دستياب هوندو. ان ۾ ماڻهي جي مک جي پالنا به ڪري سگهجي ٿي.

موسمي تبديلين کي گهٽائڻ لاءِ خاص گالهيون.

- وڻن جي وڌ ۾ وڌ پوکي ڪريو. ميوي واري وڻن کي اوليت ڏيو. سوانجهري ۽ ٻين فائديمند وڻن جي وڌيڪ پوکي ڪريو.
- ٽريڪٽر ۽ ڊيزل تي هلندڙ مشينن جو استعمال گهٽ ۾ گهٽ ڪريو.

- فصلن جي وارڻ ڪريو.

- زمين جي زرخيزي کي بحال رکن جا قدرتي طريقا اپنائيو. جهڙوڪ وڻ جي ڀان جو استعمال، سائي پاڻ جو استعمال، ڦري وارن فصلن جي پوکي ڪرڻ، نامياتي مادي کي وڌائڻ، فالتو پاڻي جي نيڪال جو جوڳو بندوبست رکڻ وغيره.

- ڪيميائي زهرن ۽ ڪيميائي پاڻن جو غير ضروري استعمال نه ڪريو. ان جي جڳهه تي آڻي-ٻي-ايمر يعني جيتن تي ضابطي ڪرڻ جي گڏيل حڪمت عملي تي عمل ڪريو. جيتن ۽ بيمارين جي خلاف قوت مدافعت رکندڙ جنسن جي پوکي ڪريو.

- پاڻي جي بچت جي طريقن جو استعمال ڪريو. جهڙوڪ ڦڙي ڦڙي وارو آبپاشي وارو طريقو، ڦوهاري وارو طريقو، ليزر ليولر جو استعمال، واهن ۽ شاخن جو پڪو ڪرائڻ وغيره.
- روايتي زرعي طريقن کي جديد ڪلائيميت سمارٽ ايگريڪلچر جي طريقن سان بدليو.

- ويجهي زرعي توسيع کاتي جي ماهرن سان رابطي ۾ رهو ۽ پنهنجي پاڻ کي وقت سان گڏ زرعي ڄاڻ ۾ اپڊيٽ رکو. ♦

جڏهن ٽي سارين جي فصل مان زمين وانڌي ٿي ۽ پير سهڻ جهڙي ٿئي ته ان ۾ ڊي-ايس آر ناڙي واري مشين جي ذريعي ڪٽڪ ناڙي ڪجي. هن سان زمين تياري وارو هن جو جو خرچ به بچي پوندو ۽ ڪٽڪ جي پوکي به وقتاوت ٿي پوندي، فاسفورس پاڻ به بچ سان گڏ ناڙي وسيلي اچي ويندو. پاڻي جي بچت ٿيندي ۽ پيداوار ۾ به اضافو ٿيندو. هن طريقي سان سارين مان فارغ ٿيندڙ زمين ۾ ٻيا فصل جهڙوڪ سرنهن، توربو، آهريو، ڄاڻ، برسيم وغيره به آساني سان بغير زمين ڪيڙي جي پوکي سگهجن ٿا. ان کان علاوه ڊائريڪٽ سيڊر مشينون (هٿ جي مدد سان سڌو سئون بچ پوکيندڙ) به مارڪيٽ ۾ اچي ويون آهن جنهن جي مدد سان بغير زمين ڪيڙي ڪئي ڀاڄين جا بچ پوکي سگهجن ٿا.

ڪافي آبادگار آڪٽوبر مهيني ۾ وڻن جي بيٺل فصل ۾ ڪٽڪ جو بچ ڇڏيندا آهن بغير زمين جي تياري جي ۽ اها ڪٽڪ به 40 کان 45 مڻ في ايڪڙ ڏيندي آهي.

2. زمين جو مٿيون ته ڍڪيل هجڻ.

جديد تحقيق موجب زمين جيڪڏهن ڍڪيل هوندي ته هن مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس خارج ٿي ڪري ماحول ۾ شامل نه ٿيندي، هن لاءِ زمين کي فصلن سان ڍڪي رکجي، اهڙا فصل پوکجن جنهن سان زمين ۾ خال نه رهي. جيڪڏهن خال هجن ته مکيه فصل جي اندر ٻين فصلن جي پوکي ڪجي. جهڙوڪ وڻن ۾ منڱ، چوئرا ۽ ڏاٽا وغيره پوکي سگهجن ٿا. هن طريقي سان زمين به ڍڪجي ويندي ۽ اضافي پيداوار به حاصل ٿيندي. جيڪڏهن فصلن سان زمين ڍڪڻ ممڪن نه هجي ته پوءِ ملچنگ ڪجي. ملچنگ مان مراد سڪل پنن، سارين جي پال، ڪمند جي ڪوري ۽ ٻين فصلن جي بڇا به جات سان خالي حصن کي ڍڪجي. ان سان ڪاربان گئس به زمين اندر رهندي، زمين سوڪهڙو به نه ڪندي ۽ بنجر زمين به زرخيز ٿي پوندي. اڄڪلهه ملچنگ لاءِ پلاسٽڪ شيٽس جو استعمال به ٿئي ٿو.

3. فصلن جي وارڻ ڪرڻ.

ساڳي زمين ۾ هر سال ساڳيا فصل نه پوکجن، ساڳيا فصل پوکڻ سان زمين جي زرخيزي متاثر ٿئي ٿي هن ۾ خوراڪي جزن جي کوٽ پيدا ٿئي ٿي، بيمارين ۽ نقصانڪار جيتن جو حملو به وڌيڪ ٿئي ٿو. تنهن ڪري هميشه فصلن جي مٽا مٽا ڪندو رهجي، هر ٽن سالن ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ دفعو ڦري وارو فصل جهڙوڪ سرنهن، برسيم، جنتر، گوار وغيره ضرور پوکيو. هن

ڇا سمنڊ سنڌوءَ جي ڊيلٽا کي ڳيهي ويندو؟

ڊاڪٽر الطاف سيال

ڊين، فيڪلٽي آف ايگريڪلچرل انجنيئرنگ

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

siyal@yahoo.com

دنيا ۾ ننڍين جا ڊيلٽا (چوڙ وار علائقا) زمين جي فقط هڪ سيڪڙو ايراضي تي پکيڙيل آهن پر انهن ۾ لڳ ڀڳ اڌ ارب ماڻهو رهن ٿا. زرخيز زمين. سامونڊي پيلن ۽ وڏي مقدار ۾ مڇي جي پيداوار جي ڪري دريائي ڊيلٽائن جو خوراڪ جي پائيدار فراهمي ۽ معاشي ترقي ۾ هڪ اهم ڪردار رهيو آهي. لڳ ڀڳ

تيرنهن هزار اسڪوائر ڪلوميٽرن يا 32 لک ايڪڙن تي پکيڙيل ”سنڌو جي ڊيلٽا“ يا انڊس ڊيلٽا جو به ڪڏهن عروج هو جتي سنڌو درياءُ بادشاه بنا بندن ۽ رڪاوٽن جي مختلف ڇاڙهن ۾ ورهائجي وڃي سمنڊ سان ملندو هو. چيو وڃي ٿو ته ان وقت ساليانو لت اچڻ ڪري زمين تمام گهڻي زرخيز هئي جنهنڪري زرعي پيداوار تمام ججهي ٿيندي هئي. هن علائقي جي ڳاڙها چانور ديسان ديس مشهور هئا. انهن چانورن جو واپار سمنڊ وسيلي مختلف ڏيهن سان هلندو هو.

ڍنڍون، ڍورا ۽ تهر جا ٻيلا هجڻ ڪري هن علائقي مان مڇي ۽ جهمينگن جي تمام وڏي پيداوار حاصل ٿيندي هئي. جنهن ڪري ڊيلٽا وارو حصو سنڌ جي ٻين پرڳڻن کان خوشحال هو. پر پوءِ زراعت لاءِ پاڻي جي کوٽ جو جواز ڄاڻائي ۽ درياءَ جي پڇاڙ تي پونڊر سخت اثرن کي پاسي تي رکي، درياءَ جي مٿين پاسي

ڊيمن، بيراجن، لنڪ ڪينالن جو چار وڇائي سنڌوءَ کي پابند سلاسل ڪيو ويو. نتيجي ۾ انڊس ڊيلٽا جو عروج ختم ٿي ويو ۽ ان جي ماحول، نباتات، ايڪولاڊي، جيومارفالاڊي، هائڊرولاڊي وغيره ۾ هر گذرندڙ ڏينهن سان گڏ تباهي اچڻ شروع ٿي.

سنڌوءَ جي ڊيلٽا کي دنيا جو پنجون نمبر وڏو ڊيلٽا قرار ڏنو ويو آهي جيڪو سرڪريڪ کان ڦٽي ڪريڪ تائين ڦهليل آهي. ڊيلٽا جي اهميت کي نظر ۾ رکندي ان کي سنه 2002ع ۾ ”رامسر سائيٽ“ قرار ڏنو ويو آهي. ڊيلٽا جي سامونڊي ڪناري جي ڊيگهه لڳ ڀڳ 180 ڪلوميٽر آهي ۽ سنڌوءَ جو ڊيلٽا سنڌ جي ٽن ضلعن يعني ٺٽي، سجاول ۽ بدين ۾ ڦهليل آهي. موجوده ڊيلٽا کي طبعي طور ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. وڏي ڇڙهڻ وارو سيلابي علائقو (Tidal Flood Plain) جيڪو ڪُل ڊيلٽا جو لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو ٿئي ٿو ان سان گڏوگڏ وسيع ڪلراڻو غير آباد علائقو ۽ واهن وسيلي آباد ٿيندڙ زرعي علائقو. سجاول ضلعي ۾ وڏي ڇڙهڻ

واري علائقي جي ايراضي ٺٽي ضلعي واري پاسي وڏي ڇڙهڻ وارو علائقي کان ٻيئي آهي ۽ گهڻو هموار آهي. انڪري سجاول ضلعي ۾ ٻين ساحلي ضلعن جي پيٽ ۾ سمنڊ جي ڌڪي اچڻ (Seawater Intrusion) ۽ سامونڊي آفتن اچڻ ڪري نقصان جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن.

هن وقت سنڌو جي ڊيلٽا کي انيڪ مسئلا درپيش آهن. جن ۾ سامونڊي ڪناري جو ڪاٽ (Coastal Erosion)، زمين جي مٿاڇري تي ۽ زير زمين سمنڊ جو خشڪي طرف

ڌڪي اچڻ (Seawater Intrusion)، متحرڪ ڊيلٽا جو سطح، ساڪلونن کان بچاءُ لاءِ بند جو نه هجڻ، زمينن جو ڪلراڻو ٿيڻ، جر جو ڪارو ٿيڻ، ڊيلٽا طرف ايندڙ دريائي پاڻي ۽ لٽ ۾ نمايان ڪمي، ڍنڍن ۽ ڍورن جو ڪارو ٿيڻ، وڌندڙ بيروزگاري ۽ غربت شامل آهن. سمنڊ ڊيلٽا جي ڪناري کي پاڻي ۽

1955ع ۾ يو ايس آرمي ميپ سروس طرفان پاڪستان ۽ هندستان جي ٺاهيل نقشن (Topo maps) جو جائزو وٺڻ سان خبر پوي ٿي ته ڪافي ڳوٺ، مقام، واهڻ ۽ وسنديون ان وقت آباد ۽ شاداب هئا ۽ اهي سامونڊي وڏي ڇڙهڻ واري سيلابي علائقي (Tidal floodplain) کان ٻاهر هئا پر اڄ اهي ان دلداري علائقي جو حصو بڻجي تباه ٿي ڪنڊر بڻجي ويا آهن. جنهن ۾ پير شاه صمندو جو مقبرو شاه قاسم جو مقبرو ڳوٺ ولي محمد جت، قاسم جت، ڳوٺ خليفا مبارڪ، ڳوٺ ڇاچلو رتو ڪوٽ قلعو، ڳوٺ خچر، ڳوٺ خدا بخش، چچ ولي محمد، ڳوٺ ارب، ڳوٺ نٿو سميت ڪافي ڳوٺ شامل آهن. انهن مان ڪجهه جا ته تباه ٿيل نشان موجود آهن پر ڪافي ڳوٺن ۽ وسندين جا ته نشان ئي سامونڊي وڏي ڇڙهڻ ۾ ميساري ڇڏيا آهن.

خشڪي طرف گهڙي ڪري اچي ڊيلٽا کي آهستي آهستي ڳهي رهيو آهي.

سندوءَ جي ڊيلٽا جي زمين گهڻو ڪري هموار آهي ۽ ان جي لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو ايراضي سمنڊ جي سطح کان صرف پنج ميٽر مٿي آهي. انڪري ڊيلٽا سمنڊ کان ايندڙ قدرتي آفتن ۽ ٻوڏن لاءِ نهايت موزون آهي. اهو ئي سبب آهي جو جڏهن به سامونڊي طوفان سنڌ طرف آيو آهي ته ان هڪ وڏي علائقي ۾ تباهي آندي آهي. سن 1965ع، 1999ع ۽ 2007ع ۾ آيل سائڪلونن سبب آيل تباهين جا نقش اڄ به ڊيلٽا جي ماڻهن جي دلين ۾ نقش آهن. ٻيو ته چوماسي ۾ اڪثر 35 في ڪلاڪ جي رفتار سان گھلندڙ هوائن جي نتيجي ۾ سامونڊي لهرن ۽ ويرن چڙهڻ جي ڪري پڻ سامونڊي ڪناري سان آباد ڳوٺ اڪثر ڪري سامونڊي پاڻي ۾ ٻڏندا رهندا آهن.

هڪ اندازي مطابق پيراجن، ڊيمن ۽ لنڪ ڪينالن ۾ قيد ٿيڻ کان هن وقت تائين ڊيلٽا طرف ايندڙ سنڌو جي پاڻي ۾ اندازن 80 سيڪڙو گھٽتائي آئي آهي نتيجي ۾ ڊيلٽا لاءِ زندگي

سندوءَ جي ڊيلٽا جي سامونڊي ڪناري سان سمنڊ ۾ پاڻي جي ليول هڪ کان ٻه ملي ميٽر ساليانو جي حساب سان وڌي رهي آهي. نتيجي ۾ ڊيلٽا جي زمين هموار هجڻ ڪري سمنڊ تيزي سان خشڪي طرف وڌي رهيو آهي. ان سڄي عمل کي روڪڻ لاءِ سندوءَ ۾ ڊيلٽا طرف ايندڙ ڪٽ ۽ پاڻي پنهنجو ڪردار ادا ڪندا رهيا آهن. جن ۾ هاڻي نمايان گھٽتائي ٿي وئي آهي.

1955ع ۾ يوايس آرمي ميپ سروس طرفان پاڪستان ۽ هندستان جي ٺاهيل نقشن (Topo maps) جو جائزو وٺڻ سان خبر پوي ٿي ته ڪافي ڳوٺ، مقام، واهڻ ۽ وسنديون ان وقت آباد ۽ شاداب هئا ۽ اهي سامونڊي ويرن واري سيلابي علائقي (Tidal floodplain) کان ٻاهر هئا پر اڄ اهي ان دلدي علائقي جو حصو بڻجي تباه ٿي ڪنڊر بڻجي ويا آهن. جنهن ۾ پير شاه صمندو جو مقبرو، شاه قاسم جو مقبرو، ڳوٺ ولي محمد جت، قاسم جت، ڳوٺ خليفا مبارڪ، ڳوٺ چاچلو رتو ڪوٽ قلعو، ڳوٺ خچر، ڳوٺ خدا بخش، چچ ولي محمد، ڳوٺ ارب، ڳوٺ نٿو سميت ڪافي ڳوٺ شامل آهن. انهن مان ڪجهه جا ته

تباه ٿيل نشان موجود آهن پر ڪافي ڳوٺن ۽ وسندين جا ته نشان ئي سامونڊي ويرن ميساري ڇڏيا آهن. پير شاه صمندو جي مقبري جا نشان جاتي شهر کان 34 ڪلوميٽر ڏکڻ اوڀر طرف صمندو ڪريڪ جي اڀرندي ڪناري تي سامونڊي ويرن واري علائقي ۾ آهن.

سامونڊي ڪنارن سان آباد شهرن جي سمنڊ ۾ ٻڏڻ بابت هڪ تازي ڪوجنا مطابق ته سمنڊ ۾ پاڻي جي ليول مٿي چڙهڻ ۽ زمين جي ويهڻ (Land subsidence) جي ڪري دنيا جا ڪافي شهر سمنڊ ۾ ٻڏڻ طرف

وڃي رهيا آهن. جن ۾ استنبول، لاگوس، ممبئي، آڪلينڊ، جڪارٽا، چٽاگانگ، منيلا، ٽي آنجن ۽ ڪراچي شامل آهن. سنڌ جي ساحلي علائقن جي زمين 10 ملي ميٽر ساليانو جي حساب سان ويهي رهي آهي. جيڪا سمنڊ جي پاڻي جي ليول مٿي چڙهڻ کان پنجوڻ تي وڌيڪ آهي. ان حساب سان ساليانو

سندوءَ جي ڊيلٽا جي زمين گهڻو ڪري هموار آهي ۽ ان جي لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو ايراضي سمنڊ جي سطح کان صرف پنج ميٽر مٿي آهي. انڪري ڊيلٽا سمنڊ کان ايندڙ قدرتي آفتن ۽ ٻوڏن لاءِ نهايت موزون آهي. اهو ئي سبب آهي جو جڏهن به سامونڊي طوفان سنڌ طرف آيو آهي ته ان هڪ وڏي علائقي ۾ تباهي آندي آهي. سن 1965ع، 1999ع ۽ 2007ع ۾ آيل سائڪلونن سبب آيل تباهين جا نقش اڄ به ڊيلٽا جي ماڻهن جي دلين ۾ نقش آهن. ٻيو ته چوماسي ۾ اڪثر 35 في ڪلاڪ جي رفتار سان گھلندڙ هوائن جي نتيجي ۾ سامونڊي لهرن ۽ ويرن چڙهڻ جي ڪري پڻ سامونڊي ڪناري سان آباد ڳوٺ اڪثر ڪري سامونڊي پاڻي ۾ ٻڏندا رهندا آهن.

جي حيثيت رکندڙ ۽ پاڻي سان وهي ايندڙ ڪٽ ۾ پڻ نمايان گھٽتائي آئي آهي. چيو وڃي ٿو ته ويهين صدي ۾ ڊيلٽا ۾ ڪٽ جمع ٿيڻ جي شرح ساليانو 8 ملي ميٽر هئي جيڪا ايڪويهين صدي ۾ گھٽجي اچي هڪ ملي ميٽر ساليانو تي پهتي آهي. نتيجي ۾ سامونڊي ڪنارو کاڌ جو شڪار آهي. هڪ تحقيق مطابق ته سامونڊي ڪنارو اندازن ساليانو 28 ميٽر خشڪي طرف وڌي رهيو آهي. سامونڊي کاڌ جو اثر سڀ

کان وڌيڪ سڃاڻل ضلعي ۾ موجود ”وڙي ڪريڪ“ ۽ ”ڪوبر ڪريڪ“ وارو علائقي تي آهي جتان سمنڊ تيزي سان خشڪي طرف وڌي رهيو آهي.

موسمي تبديلين جي نتيجي ۾ گلشن جي رجڻ ڪري سمنڊ ۾ پاڻي جي سطح مٿي وڃي رهي آهي. هڪ اندازي مطابق

سندھ وٽ سمنڊ جي ليول 12 ملي ميٽر وڌي رهي آهي. زمين ويهڻ جا مختلف سبب ڄاڻايا وڃن ٿا. جن ۾ زميني بناوت، زميني پليٽن جي حرڪت، جر جو پاڻي جمجمي مقدار ۾ ڪيڊ ۽ تيل ڪيڊ شامل آهن. جيڪڏهن تدبيري اُپاءَ نه ورتا ويا ته موسمي تبديلين جي نتيجي ۾ سمنڊ جي ليول وڌڻ ۽ زمين جي ويهڻ (Land Subsidence) جو گڏيل نتيجو اهو نڪرندو جو سمنڊ سنڌوءَ جو ڊيلٽا کي آهستي آهستي ڳهي ويندو. انڪري هن وقت انڊس ڊيلٽا، گورنمنٽ، پاليسي ساز ادارن ۽ سنجيده، قابل ۽ ساڪرڪنڊر ادارن جي هنگامي توجه جو مرڪز هجڻ گهرجي.

جا پيلا قدرتي آفتن جهڙوڪ: وڏين ويرن، سامونڊي طوفانن ۽ سونامي جي اثرن کان گهٽائڻ ۾ مڪرڊا ادا ڪندي پهرين مورچي جو ڪم ڪن ٿا. ان کان علاوه تمر جا پيلا لٽ کي جملي ۽ جمائي سامونڊي ڪناري کي وڌائڻ ۾ مدد ڪن ٿا. ان سان گڏ مچي، جهينگن ۽ ٻي سامونڊي زندگي جي واڌ ويجهه سان گڏ ساحلي علائقن ۾ رهندڙ آبادي کي ڪاٺ، چراگاهه ۽ روزگار مهيا ڪن ٿا. سامونڊي وير آهستي چڙهندي آهي پر جڏهن لهندي آهي ته اها تيزي سان لهندي آهي نتيجي ۾ اها ڪاٺ پيدا ڪندي آهي. خاص ڪري انهن علائقن ۾ جتي تمر جا پيلا نه هوندا آهن. انڪري تمر جي پيلن کي وڌائجي ۽ انهن جي غير قانوني واڌي تي بندش وڃمجي.

4. ڊيلٽا ۾ موجود ڍنڍون ۽ ڍورا اڪثر ڪارڻ ٿي ويا آهن. انهن کي بحال ڪري برسات دوران پاڻي گڏ ڪري ذخيره ڪيو وڃي. اهو پاڻي ضرورت وقت پيئڻ ۽ زراعت لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو. انهن ڍنڍن ۾ گڏ ٿيل پاڻي سيمو ڪري جر جي پاڻي کي

بين الاقوامي ماهرن طرفان سفارش ڪيل سراسري طور ساليانو گهٽ ۾ گهٽ 8.6 ملين ايڪڙ فوت (MAF) پاڻي کي ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ ماحولياتي وهڪري طور ڇڏيو وڃي. انهي سان گڏ، ڪوٽڙي بيراج کان نڪرندڙ واهن ۾ پڻ جمجمو پاڻي ڇڏيو وڃي ته جيئن پاڻي ڊيلٽا جي پڇاڙ تائين پهچي ۽ سامونڊي پاڻي جي مداخلت (Seawater Intrusion) تي ضابطو آڻي. آبپاشي لاءِ ٺهيل واه، ڍورا ۽ شاخون سنڌونديءَ کان پري واري علائقن ۾ سامونڊي مداخلت تي ضابطو آڻڻ ۽ جر واري پاڻي کي بهتر ڪرڻ ۾ وڌيڪ اثرائتا ۽ مفيد آهن.

حڪومت ۽ وس وارن کي ڊيلٽا جي بچاءَ ۽ بحالي لاءِ ڪجهه مکيه تجويزون ڏجن ٿيون جن تي سنجيدگي سان غور ۽ فڪر ڪري انهن تي عمل ڪيو وڃي ان کان پهرين جو سڄو ڊيلٽا سمنڊ ڳهي وڃي.

1. بين الاقوامي ماهرن طرفان سفارش ڪيل سراسري طور ساليانو گهٽ ۾ گهٽ 8.6 ملين ايڪڙ فوت (MAF) پاڻي کي ڪوٽڙي بيراج کان

بهتر ڪندو.

5. سمنڊ جو زمين جي مٿاڇري تي گهڙي اچڻ (Surface Seawater Intrusion) کي گهٽائڻ لاءِ ڪوسٽل هائي وي جي اڳ ۾ ٺهيل 28 ڪلوميٽر حصي کي سامونڊي ويرن واري حدن (Periphery) سان گڏ اڳتي وڌائي ”سجڻ واري“ وٽ سنڌوءَ تي ڀل وجهي ان کي علي بندر تائين ڪڍي وڃجي. ان هائي وي جي تعمير ڪرڻ سان ٽي فائدا حاصل ٿيندا. هڪ ته سامونڊي ڪناري جي ماڻهن کي زرعي توڙي سامونڊي پيداوار کي ڪراچي جي منڊين ۾ پهچائڻ تمام سولو سستو ۽ تڪڙو ٿي پوندو. ٻيو ته سمنڊ جي پاڻي جي وڌندڙ سطح ۽ زمين جي ويهڻ جي ڪري روزانو جي بنياد تي خشڪي طرف وڌندڙ سمنڊ کي روڪي سگهيو. ٽيون ته سائڪلون يا سونامي جي شدت کي گهٽ ڪرڻ لاءِ هي هائي وي ٻي مورچي جو ڪم ڏيندي.

هيٺ ماحولياتي وهڪري طور ڇڏيو وڃي. انهي سان گڏ، ڪوٽڙي بيراج کان نڪرندڙ واهن ۾ پڻ جمجمو پاڻي ڇڏيو وڃي ته جيئن پاڻي ڊيلٽا جي پڇاڙ تائين پهچي ۽ سامونڊي پاڻي جي مداخلت (Seawater Intrusion) تي ضابطو آڻي. آبپاشي لاءِ ٺهيل واه، ڍورا ۽ شاخون سنڌونديءَ کان پري واري علائقن ۾ سامونڊي مداخلت تي ضابطو آڻڻ ۽ جر واري پاڻي کي بهتر ڪرڻ ۾ وڌيڪ اثرائتا ۽ مفيد آهن.

2. ڊيلٽا ۾ موجود پراڻن وهڪرن يا ڍورن جهڙوڪ ”اوچتو“ ۽ ”گونگري“ کي بحال ڪيو وڃي انهن جو درياءَ سان ڪٽيل رابطو وري بحال ڪيو وڃي. انهن جي بحالي سان هڪ ته دريائي ٻوڏ دوران درياءَ جي بندن تي دٻاءُ گهٽيو ٻيو ته پاڻي ۽ لٽ انهن وهڪرن وسيلي سڄي ڪناري سان چوڙ ٿيندو ۽ درياءَ جو پاڻي سڄي ڊيلٽا جي ماڻهن تائين پهچندو.

3. انڊس ڊيلٽا جي ويرن واري سيلابي علائقي تي تمر جي پوکي کي همٿايو وڃي خاص ڪري سجاول ضلعي ۾ تمر

پروفیسر ڊاڪٽر محمد خان لوهار: تعزيتي ميڙاڪو

گلشير لوجي

پبلڪ رليشنز آفيسر
سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

ڊاڪٽر محمد خان لوهار جي ياد ۾ تعزيتي ميڙاڪو ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي شهيد ذوالفقار علي ڀٽو زرعي ڪاليج ڏوڪري طرفان منعقد ڪيو ويو. جنهن جي صدارت ڊاڪٽر سلطان احمد ميتلو ڪئي. پروگرام جي شروعات تلاوت قرآن پاڪ سان ڪئي وئي. پروگرام ۾ اسٽيج سيڪريٽري لاءِ ڊاڪٽر شاهجهان راجپوت ڪردار ادا ڪيو ۽ ڊاڪٽر لوهار جي ڪيل خدمتن کي ساراهيو. ڊاڪٽر راجپوت وڌيڪ ٻڌايو ته

ڊاڪٽر محمد خان لوهار تعليمي شعبي ۽ زرعي تحقيق ۾ تمام گهڻي مهارت رکندو هيو جنهن جي ڪري شاگرد، زرعي ماهر مشورن جي لاءِ سندس آفيس ۾ هلي ايندا هيا ڊاڪٽر راجپوت وڌيڪ ٻڌايو ته ڊاڪٽر محمد خان لوهار شاگرد جو پسندیده استاد هيو. ڊاڪٽر لوهار پنهنجي ڪيريئر دوران يونيورسٽي ۾ ڪيترائي تعليمي، ثقافتي، ڊراما ۽ چٽاڀيٽي جي

پروگرامن لاءِ استادن شاگردن جي تنظيم جو انچارج پڻ رهيو جنهن ۾ مختلف پروگرامن ۾ شاگردن کي سکيا ڏني. پروفيسر ڊاڪٽر محمد خان لوهار جي مغفرت لاءِ دعا ڪئي وئي ۽ پڻ هڪ منٽ جي خاموشي اختيار ڪئي وئي ۽ سائين جن کي خراج تحسین پیش ڪئي وئي. ان موقعي تي اينٿامالاجي ڊپارٽمينٽ جي چيئرمين پروفيسر ڊاڪٽر شاهنواز کهڙو سندن ڪيل خدمتن تي تفصيلي روشني وڌي

ڊاڪٽر کهڙو ٻڌايو ته ڊاڪٽر محمد خان لوهار ضلعي بدين جي ڳوٺ کورواهه ۾ 01 سيپٽمبر 1950 ۾ لوهار فيملي ۾ جنم ورتو. ڊاڪٽر لوهار جو واسطو لوهار فيملي جي هڪ غريب گهراڻي سان هيو. هو ننڍي هوندي کان ئي محنتي ۽ هوشيار هو. ڊاڪٽر لوهار شروعاتي تعليم پنهنجي ڳوٺ ۾ پرائي. ڊاڪٽر لوهار M.Sc جي ڊگري مڪمل ڪرڻ کانپوءِ ليڪچرر طور 18 مئي 1973 ۾ اينٿامالاجي ڊپارٽمينٽ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام ۾ مقرر ٿيو. ڊاڪٽر لوهار 1973 کان وٺي 2011 تائين سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام سان لاڳاپيل رهيو. ڊاڪٽر لوهار صاحب جو وڇوڙو 24 جنوري 2022 تي ٿيو. جنهن کي ڪلهوڙا ڪالوني قبرستان حيدرآباد ۾ مٽيءَ ماءُ حوالي ڪيو ويو. وڌيڪ ٻڌايو ته ڊاڪٽر لوهار جو وڇوڙو زرعي تعليم ۽ زرعي ريسرچ جي لاءِ وڏو خال پيدا ٿيو آهي. ۽ اسان هڪ ماهر تعليمدان، زرعي تحقيق جو ماهر، ڊراما نگار ۽ اسڪالر کان محروم ٿي ويا آهيون. ڊاڪٽر محمد خان لوهار زراعت جي تعليم ۽ زرعي ريسرچ جي بهتري لاءِ تمام اهم ڪردار ادا ڪيو. ڊاڪٽر لوهار آبادگارن جي رهنمائي لاءِ ريسرچ پروجيڪٽ ڪيا ۽

ڊاڪٽر محمد خان لوهار زراعت جي تعليم ۽ زرعي ريسرچ جي بهتري لاءِ تمام اهم ڪردار ادا ڪيو. ڊاڪٽر لوهار آبادگارن جي رهنمائي لاءِ ريسرچ پروجيڪٽ ڪيا ۽ آبادگارن کي زرعي تحقيق بابت سکيا ڏني. ان پنهنجي حياتي ۾ ڪيترن ئي شاگردن کي M.Sc MPhil ۽ PhD جون ڊگريون ڏنيون. سائين پنهنجي نوڪري دوران زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام ۾ گهڻن عهدن تي مقرر رهيو. ڊاڪٽر لوهار ڊين فيڪلٽي آف ڪراپ پروٽيڪشن ۽ ٽي دفعا چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي پڻ رهيو. ڊاڪٽر محمد خان لوهار ڪيترن ئي گورنمينٽ آرگنائيزيشن جو ميمبر پڻ رهيو.

پروجيڪٽ ڪيا ۽ آبادگارن کي زرعي تحقيق بابت سکيا ڏني. ان پنهنجي حياتي ۾ ڪيترن ئي شاگردن کي M.Sc MPhil ۽ PhD جون ڊگريون ڏنيون. سائين پنهنجي نوڪري دوران زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام ۾ گهڻن عهدن تي مقرر رهيو. ڊاڪٽر لوهار ڊين فيڪلٽي آف ڪراپ پروٽيڪشن ۽ ٽي دفعا

چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي پڻ رهيو. ڊاڪٽر محمد خان لوهار ڪيترن ئي گورنمينٽ آرگنائيزيشن جو ميمبر پڻ رهيو. ڊاڪٽر محمد خان لوهار 100 کان مٿي زرعي مقالا جيڪي قومي ۽ بين الاقوامي سطح تي مختلف جرنلن ۾ ڇپيا. ڊاڪٽر لوهار پنجن کان وڌيڪ اينٿامالاجي جي ڪتابن جو ليکڪ پڻ رهيو. جيڪي اينٿامالاجي شعبي جي شاگردن، آبادگارن، استادن ۽ زرعي ڪمپنين جي لاءِ تمام

ادارن ۾ اعليٰ عهدن تي فائز آهن جيڪي ملڪ جي زرعي معشيت جي واڌاري ۾ اهم ڪردار ادا ڪري رهيا آهن انهن ۾ پروفيسر ڊاڪٽر جان محمد مري پرووائيس چانسلر سنڌ زرعي يونيورسٽي ڪئمپس عمرڪوٽ، ڊاڪٽر عبدالغني لنجار اڳوڻو ڊين فيڪلٽي ڪراچي پروفيسر ڊاڪٽر پائي خان سولنگي، پروفيسر ڊاڪٽر اسلم بڪيرو سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام، پروفيسر ڊاڪٽر علي نواز مهر اڳوڻو چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف انٿامالاجي زرعي ڪاليج ڏوڪري، پروفيسر ڊاڪٽر محمد هارون هليو، ڊاڪٽر غلام سرور سولنگي ايسوسيئيٽ پروفيسر، ڊاڪٽر شاهنواز ڪهڙو ايسوسيئيٽ پروفيسر چيئرمين ڊپارٽمينٽ آف انٿامالاجي شهيد ذوالفقار علي ڀٽو زرعي ڪاليج ڏوڪري شامل آهن. جيڪي زراعت جي شعبي ۾ پنهنجو نمايان ڪردار ادا ڪري رهيا آهن، ان موقعي تي ڊاڪٽر ميتلو اينٿامالاجي شعبي جي چيئرمين ڊاڪٽر شاهنواز ڪهڙو ۽ سڀني استادن کي اهڙين هستين جي ياد ۾ پروگرام منعقد ڪرڻ تي ساراهيو.



آخر ۾ پروفيسر ڊاڪٽر عبدالحنان پرڙي سڀني آيل مهمانن جو شڪريو ادا ڪيو ۽ ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي جي چيئرمين ڊاڪٽر شاهنواز ڪهڙو غلام سرور سولنگي، ڊاڪٽر شاهجهان راجپوت ۽ ميڊم شبانه ناز مزاری ۽ شاگردن کي هن پروگرام کي منعقد ڪرڻ تي شڪريو ادا ڪيو ۽ چيو ته اهڙو پروگرام اسان کي پنهنجي محسن استاد هستين تي منعقد ڪرڻ گهرجن ته جيئن اسان سڀ انهن جي ڪيل خدمتن مان رهنمائي حاصل ڪري سگهون. هن پروگرام ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو زرعي ڪاليج جي سڀني استادن، شاگردن ۽ ملازمن وڏي تعداد ۾ شرڪت ڪئي.

گهڻا مفيد ثابت ٿيا آهن. انهن ڪتابن ۾ مشهور ڪتابن ۾ Introductory Entomology, General Entomology, Applied Entomology, Dictionary of Entomology, شامل آهن جيڪي آسان انگريزي ٻولي ۾ لکيل آهن، جن کي شاگرد تمام گهڻو پسند ڪندا آهن ۽ ڪجهه ڪتاب هائير ايڄوڪيشن جي سيلبس ۾ شامل ڪيا ويا آهن. ڊاڪٽر لوهار ڪيترن ئي قومي ۽ بين الاقومي سطح تي ٽريننگ سڪيائن ۾ شرڪت ڪئي، ان سان گڏوگڏ سائين جن جا اخبارن ۾ به ڪيترائي مقالا ڇپيا ۽ سائين پڻ ڪيترن ئي ڊرامن جو ليکڪ پڻ رهيو. جيڪي معاشري جي مختلف پهلوئن کي اجاگر ڪرڻ لاءِ اهم ثابت ٿيا ۽ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ڪلچر کي نمايان انداز ۾ پيش ڪيو ۽ ترقي ڏياري.

كُلُ نَفْسٍ دَآيِقَةُ الْمَوْتِ

Condolence Meeting

With heart felt sympathy
we invite you to attend a meeting.

In Memory of

PROF. DR. M.K LOHAR

Department of Entomology, SAU Tandojam

Time: 10am
Date: Thursday 03-03-2022
Venue: Department of Entomology

Organized By:
Department of Entomology, SZABAC Dokri

ان موقعي تي ڊاڪٽر غلام سرور سولنگي ڳالهائيندي چيو ته ڊاڪٽر لوهار صاحب هڪ شفيق استاد رهيو ۽ اسان اڄ جيڪو به هن منزل تي آهيون اهو ڊاڪٽر لوهار صاحب جي ڪري آهيون. سائين ٻڌايو ته ڊاڪٽر لوهار صاحب زرعي تعليم ۽ زرعي ريسرچ جو خزانو هيو جنهن مان ڪيترائي زرعي سائنسدان پيدا ٿيا. ان موقعي تي ڊاڪٽر عبدالحميد ميمڻ پنهنجي خيالن جو اظهار ڪندي چيو ته اهي ماڻهو مرڻا ناهن، جيڪي ڪلندي ڪلندي هليا ويا انهن مان سائين محمد خان لوهار هڪ آهي. جسماني طور ته سائين اسان کان وڇڙي ويو آهي پر روحاني طور سائين جون يادون سائين جون لکڻيون هميشه اسان سان گڏ ۽ رهنمائي ڪنديون رهنديون.

ان موقعي تي پروفيسر ڊاڪٽر سلطان احمد ميتلو ٻڌايو ته ڊاڪٽر محمد خان لوهار جو زراعت جي ترقي ۾ اهم ڪردار رهيو ڇاڪاڻ جو هن جا ڪيترائي شاگرد زراعت جي مختلف

ماھوار زرعي سائنس ۾ اشتھار ڏيڻ لاءِ اگھ

عنوان	سائيز	رنگين	بليڪ اينڊ وائيٽ
مڪ تائيتل	چوٿون حصو	Rs:25,000/=	-
مڪ تائيتل	اڌ صفحو	Rs:50,000/=	-
بيڪ تائيتل (پاهريون)	سڄو صفحو	Rs:60,000/=	-
بيڪ تائيتل (پاهريون)	اڌ صفحو	Rs:30,000/=	-
انر (مڪ صفحي جو)	سڄو صفحو	Rs:45,000/=	Rs:25,000/=
انر (پلٽين صفحي جو)	سڄو صفحو	Rs:35,000/=	Rs:20,000/=
انڊريان صفحا	سڄو صفحو	Rs:25,000/=	Rs:15,000/=

رابطي لاءِ:

اي ميل: bksolangi@gmail.com

موبائيل نمبر: 03003796765

فيڪلٽي آف اينيمل هسبنڊري اينڊ وٽريري سائنسز سنڌ زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام



مواد موڪلڻ ۽ رابطي لاءِ:

چيف ايڊيٽر، ماهوار زرعي سائنس.

سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٽامالاجي.

سنڌ زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام

Email: bksolangi@gmail.com

Cel# 0300-3796765