



ماہوار

زرعي سائنس

www.sau.edu.pk



جلد-05، شمارو-03-04، جولائي-آگسٽ، 2025 SINDH AGRICULTURE UNIVERSITY TANDOJAM



سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي





سنت زرعي سائنس سوسائٽي



سنت زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

سنت زرعي سائنس سوسائٽيءَ جا باني عهديدار

سرپرست
پروفيسر ڊاڪٽر جان محمد مري
پرو وائيس چانسلر

سينئر نائب صدر
ڊاڪٽر محمد نعيم راجپوت

جنرل سيڪريٽري
پروفيسر ڊاڪٽر شاهنواز مري

فنانس سيڪريٽري
ڊاڪٽر شعيب احمد پيرزادو

آفيس سيڪريٽري
محمد علي شيخ

سرپرست اعليٰ
پروفيسر ڊاڪٽر الطاف علي سيال
وائيس چانسلر

صدر
پروفيسر ڊاڪٽر پائي خان سولنگي

نائب صدر
ڊاڪٽر پنجل خان ٻٽ

ايڊيشنل جنرل سيڪريٽري
ڊاڪٽر محمد سليم سرڪي

انفارميشن سيڪريٽري
پروفيسر محمد منل جسڪاڻي

ايگزيڪيوٽو ڪائونسل

ڊاڪٽر عبدالوحيد سولنگي
پروفيسر ڊاڪٽر عقييل احمد ميمڻ
ڊاڪٽر علي رضا شاهه
ڊاڪٽر ذوالفقار علي عباسي
محمد سليم چانگ

پروفيسر ڊاڪٽر اعجاز حسين سومرو
پروفيسر ڊاڪٽر منير احمد مڱريو
پروفيسر ڊاڪٽر امتياز احمد نظاماڻي
پروفيسر ڊاڪٽر تنوير فاطمه مياڻو
ڊاڪٽر محمد يعقوب ڪونڊر

انڊريس: سنت زرعي سائنس سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٿامالاجي، سنت زرعي يونيورسٽي، ٽنڊو ڄام

Email: bisolangi@gmail.com Cell: 0300-3796765



سرپرست پروفيسر ڊاڪٽر جان محمد مري پرو وائيس چانسلر	سرپرست اعليٰ پروفيسر ڊاڪٽر الطاف علي سيال وائيس چانسلر
چيف ايڊيٽر پروفيسر ڊاڪٽر پائي خان سولنگي	ايگزيڪيوٽو ايڊيٽر پروفيسر ڊاڪٽر عبدالمبين لودي ڊين، فيڪلٽي آف ڪراپ پروٽيڪشن
مئنيجنگ ايڊيٽر پروفيسر محمد منل جسڪاڻي	

ايڊيٽرس

ايگريڪلچرل انجنيئرنگ ڊاڪٽر معشوق علي ٽالپر ڊاڪٽر محمود لغاري ايڊيٽر ڊاڪٽر شمس الدين ڀڳهيو ڊاڪٽر محمد نعيم راجپوت ڊاڪٽر شعيب احمد پيرزادو خيرپور ڪئمپس ڊاڪٽر علي رضا شاه عمرڪوٽ ڪئمپس محمد سليم چانگ	ڪراپ پراڊڪشن ڊاڪٽر شاهنواز مري ڊاڪٽر محمد نواز ڪانڌڙو فود سائنسز ڊاڪٽر اعجاز حسين سومرو ڪراپ پروٽيڪشن ڊاڪٽر امتياز احمد نظاماڻي ايگريڪلچرل سوشل سائنسز ڊاڪٽر ممتاز علي جويو غلام حسين وڳڻ انفارميشن ٽيڪنالاجي ڊاڪٽر پنجل خان ڀٽ ڊاڪٽر سهڻي عباسي
---	--

مواد موڪلڻ ۽ رابطي لاءِ: چيف ايڊيٽر، ماهوار زرعي سائنس سنڌ زرعي سوسائٽي ڀارٽمينٽ آف اينٽامالاجي سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام Email: bksolangi@gmail.com Cell # 0300-3796765	ڪمپوزنگ: نور نواز حاجاڻو (اسٽينوگرافر، سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي)
--	--

ايڊيٽوريل

اسان زرعي سائنس ميگزين جي پهرئين شماري کان وٺي ان ڪوشش ۾ آهيون ته پنهنجي آبادگار ڀائرن کي فصلن مان وڌيڪ اُڀت حاصل ڪرڻ جا اهي جديد زرعي طريقا ٻڌايون، جن سان انهن کي گهڻي کان گهڻو فائدو پهچي. سائنس جتي دنيا جي ٻين شعبن ۾ ترقي ڪري رهي آهي، اُتي زراعت تي پڻ گهڻو ڪم ٿي رهيو آهي، ضروري آهي ته انهن جديد لاڙن کي سمجهجي ۽ انهن تي عمل ڪري فائدو حاصل ڪجي. زرعي تحقيق جو عمل ڪو هاڻوڪو ناهي، بلڪ تمام گهڻو پراڻو آهي، ۽ سنڌ ته اُن حوالي سان صديون اڳ گهڻي شاهوڪار هئي. موهن جي دڙي سميت ٻين اهم تاريخي ماڳن جي کوٽائيءَ مان اسان کي ڪيترائي زرعي اوزار مليا آهن، جن جي دنيا کي اڃان خبر به نه هئي. قديم دور ۾ سنڌ اهو واحد خطو هو، جتي هڙن ذريعي ڪوهن مان پاڻي ڪڍي زمينن کي آباد ڪيو ويندو هو. ايران، جيڪا دنيا جي شاهوڪار تهذيب چئي وڃي ٿي، انهن به هڙن ذريعي پاڻي ڪڍڻ جو هنر سنڌ مان حاصل ڪيو هو. چوڻ جو مطلب ته اسان وٽ زرعي تحقيق جو ڪم صدين کان ٿيندو رهيو آهي، ۽ هن وقت به ٿي رهيو آهي، جنهن سان اسان جا آبادگار گهڻو فائدو حاصل ڪري رهيا آهن.

زرعي سائنس ميگزين جي پليٽ فارم تان پڙهندڙن تائين جديد ۽ تحقيقي مواد پهچائڻ جو سلسلو جاري آهي، زرعي سائنس ميگزين جولائي-آگسٽ 2025ع جو شمارو اوهان جي هٿن ۾ آهي. هن شماري ۾ بچ جي اهميت، وونئڻ جي فصل ۾ گلابي ڪينٽين جو نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا، سارين جي فصل تي حملو ڪندڙ جيتن جي سڃاڻپ ۽ انهن تي ضابطو آڻڻ جي حڪمت عملي، ڀاڄين جي افاديت وڌائڻ جا سونهري اصول، گهر ۽ اوطاق جي اڱڻ ۾ ڀاڄي جي پوک، ميون جي نرسري مڃاڻ جي اهميت ۽ طريقا، وونئڻ، مرچ ۽ بصر تي فصل تي غذائي جزن جو ڦوهارو، ڪربلي جي پوک، ميون جي نرسري تيار ڪرڻ جي حڪمت عملي، ميون جي وڻڪاري ۽ نوجوانن لاءِ روزگار، گلن جي نرسري ۽ ٻيا اهم مضمون شامل آهن، جيڪي يقيناً عام پڙهندڙن سميت آبادگارن ۽ شاگردن سان گڏوگڏ زرعي محققن، توسيعڪارن ۽ استادن لاءِ به ڪارائتا ٿيندا. هڪ ٻئي لاءِ نيڪ تمنائون ۽ دعائون

پروفيسر ڊاڪٽر ڀائي خان سولنگي
چيف ايڊيٽر، ماهوار زرعي سائنس
سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

سائنس جا احسان

ادل سومرو

سائنس جا ڪيڏا احسان،

سُڪ ۾ آهن سڀ انسان.

تيليوزن جا هر هنڌ ڏاڪا،	روشن روشن بلب ٻري ٿو،
ريڊيو روز ڪري ٿو واکا،	سمند ۾ وزني جهاز تري ٿو،
ڏسو هي چرپر ڪندڙ ڏاڪا،	پاڻي ڪولر منجه ٺري ٿو،
فون تي ڏوران ٿيڻ ڪچهريون،	جي نه ٿين ها اهي ايجادون،
ويا هن ڳنڍجي ملڪ مڪان،	ڏکيا ٿين ها سڀ گذران،
سائنس جا ڪيڏا احسان	سائنس جا ڪيڏا احسان

ڪمپيوٽر ٿو وقت کي موڙي،	عقل جو هر هنڌ ٿيو اڃالو،
لوهي بند تي ريل ٿي ڊوڙي،	چنڊ تي پهچي ويو اپالو،
هر ڪا شيءِ مشين ٿي جوڙي،	پيرن هيٺان آيو همالو،
ڪيڏيون ٿيون ايجاد دوائون،	سائنس جي سهڪار سان ماڻهو،
سولا ٿيا سارا درمان،	اوچو آهي منجه جهان،
سائنس جا ڪيڏا احسان	سائنس جا ڪيڏا احسان

فهرست

شمار نمبر	عنوان	مصنف	صفحو
1.	ٻج جي اهميت	ڊاڪٽر ظهور احمد سومرو	5
2.	وونئڻن جي فصل ۾ گلابي ڪينڙين جو نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا	غلام قادر منگريو	6
3.	سارين جي فصل تي حملو ڪندڙ جيتن جي سڃاڻپ ۽ انهن تي ضابطو آڻڻ جي حڪمت عملي	ڊاڪٽر شاهنواز کهڙو	8
4.	پاڇين جي افاديت وڌائڻ جا سونهري اصول	ابرار احمد مجيد اڻو	10
5.	گهر ۽ اوطاق جي اڱڻ ۾ يا ڇت تي پاڇيون ۽ ساوا مصالح پوکڻ جي اهميت ۽ طريقا	ڊاڪٽر اسلام الدين مجيد اڻو	11
6.	وونئڻ، مرچ ۽ بصر جي فصل تي غذائي جزن جو ڦهاريو	حسن شاه راشدي	15
7.	ڪريل جي پوک	بيبا خانزاده ۽ آڪاش پنهور	16
8.	ميون جي نرسري تيار ڪرڻ جي حڪمت عملي	ميمون اسلام	17
9.	ميون جي وڻڪاري ۽ نوجوانن لاءِ روزگار	مصطفيٰ نانگراج	19
10.	گلن جي نرسري	ميمون اسلام ۽ سراج الدين مجيد اڻو	20
11.	اسپنگر قدرت پاران سستي علاج طور تحفو	ميمون اسلام ۽ مظفر الدين چاچڙ	22
12.	نامياتي زراعت ۽ ٿر	مصطفيٰ نانگراج	23

ٻج جي اهميت

ڊاڪٽر ظهور احمد سومرو

ڊپارٽمينٽ آف پلانٽ بريڊنگ اينڊ جينيٽڪس

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

zasoomro@sau.edu.pk

پاڪستان هڪ زرعي ملڪ آهي ۽ آبادي جو تقريبن 80 سيڪڙو زراعت سان وابسته آهي. تيزي سان وڌندڙ آبادي ۽ زرعي سهولتون گهٽ ٿيڻ جي ڪري ملڪي ضرورتون پوريون ڪرڻ تمام مشڪل ٿي ويو آهي. جنهن جي لاءِ ملڪي زراعت کي ترقي ڏيارڻ لاءِ مختلف اپاءَ وٺڻ جي سخت ضرورت آهي جنهن ۾ اهم ۽ ضروري جز ٻج جو آهي. انساني زندگي تي ٻج جو تمام وڏو عمل دخل آهي. ٻج ٻوٽي جي واڌ ۽ ترقي جو پهريون عنصر آهي جنهن مان ٻوٽو پنهنجو نسل وڌائي ٿو ۽ انسانن ۽ جانورن لاءِ خوراڪ مهيا ڪري ٿو. ٻوٽا خوراڪ کان علاوه دوائن جو ذريعو پڻ آهن. ٻج جي ذريعي نسل وڌي ٿو ۽ فصل هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ تائين پهچائڻ آسان ٿيو وڃي ۽ ملڪي ڪاروبار لاءِ استعمال ٿئي ٿو. جنهن مان معلوم ٿيو ته ٻج دولت آهي. ڪجهه ٻج اصل فصل جا ٻج آهن جيڪي تمام ڪارآمد آهن جڏهن ته ڪجهه ٻج غير ڪارآمد هوندا آهن جيڪي اصل فصل ۾ مسئلا پيدا ڪندا آهن.

عام طور تي ٻج ٻن نمونن سان ٿيندا آهن هڪ اهي جيڪي سڌي طرح فصل مان ٻج ٺهندا آهن ۽ ٻيا اهي جيڪي ميوي جي اندر ٿيندا آهن. ٻجن جي اندر پروٽين، لحيات ۽ ٻيا ڪيترائي جزا ٿيندا آهن جيڪي ٻجن تي اسرڻ ۾ مدد ڪندا آهن ٻجن جي اوسر پڻ ٻن طريقن سان ٿيندي آهي هڪڙي اها جنهن ۾ نر ۽ مادو شامل هوندا آهن ۽ انهن جي ملاڻ ڪري ٻج ٺهندو آهي ۽ ٻيو طريقو اهو آهي جنهن ۾ ٻوٽي جو ڪوئي حصو استعمال ٿيندو آهي. جنهن مان پورو ٻوٽو ٺهي ويندو آهي. جيئن ته

ٻج ٻوٽي جو بنياد آهي ۽ ٻوٽا انساني غذا جو بنياد آهن ۽ ٻوٽا انسانن جي ضرورتن کي پورو ڪن ٿا، جهڙوڪ ڪاڻه، ڪاغذ، ڪپڙو، دوائن وغيره لاءِ استعمال ٿيندا آهن. هڪ سٺي ٻج ۾ هيٺيون خصوصيتون هئڻ لازم آهن.

1. جنسن جي اعليٰ درجي جي هڪجهڙائي هجي.
2. ٻج تمام بيمارين کان پاڪ هجي ۽ بيمارين لاءِ قوت مدافعت هجي.

3. ٻج جي شڪل، سائيز ۽ رنگ وڻندو هجي.
 4. ٻج ۾ اسرڻ جي صلاحيت تمام سٺي هجي.
- هڪ سٺي ٻج مان هيٺيان فائدا ملندا آهن.
1. سٺي ٻج جي استعمال سان سٺو فصل ملندو ۽ هڪ يونٽ مان گهڻي اپٽ ملندي.

2. شرح ٻج گهٽ استعمال ڪرڻو پوندو جنهن سان ناٺي جي بچت ٿيندي.

3. تمام فصل هڪ جهڙو هوندو جنهن جي ڪري پڇڻ ۽ لاباري ڪرڻ ۾ سهولت ٿيندي.

سٺي ٻج کي برقرار رکڻ لاءِ هيٺيان اپاءَ وٺڻ گهرجن.

1. فصل ۾ ڪم ايندڙ تمام مشنري کي صاف ڪيو وڃي.
2. لاباري ڪرڻ وقت ٿريشر ۽ ٻين مشينن جي صفائي ڪئي وڃي.
3. فصل ۾ بينل بين جنسن جا ٻوٽا ڪڍي فصل کي صاف ڪيو وڃي.

4. هميشه معياري ۽ تصديق ٿيل ٻج استعمال ڪجي.

انهن اصولن کي اپنائڻ سان فصل ۽ انهن سان اڳاپيل ڪمن ۾ آساني ٿيندي ۽ اصل ٻج ۾ واڌارو ايندو، جنهن جي ڪري ملڪي معيشت مضبوط ٿيندي ۽ ملڪ ترقي ڪندو.



وونئڻ جي فصل ۾ گلابي ڪينئن جي نقصان ۽ ان تي ضابطي جا ماحول دوست طريقا

غلام قادر منگريو

ايگريڪلچر آفيسر، زرعي توسيع کاتو،

ضلع سانگهڙ

gh.qadernangrio@gmail.com

جيئن ته وونئڻ اسان جي ملڪ پاڪستان جي فصلن مان هڪ اهم فصل آهي جنهن جي پوک تقريبا 2.53 ملين هيڪٽرن تي ٿئي ٿي. ڪپھ جي ملڪي پيداوار (8.84 Million Bales) آهي. وونئڻ جي فصل تي مختلف قسم جا جيت ۽ بيماريون حملو ڪن ٿا. جنهن مان گلابي ڪينئن (Pink bollworm) به هڪ آهي. هي ڪينئن تمام خطرناڪ جيت آهي. جيڪو صرف ڪپھ جي فصل تي حملي

گلابي ڪيڙي جي زندگي جو ڦيرو

آور ٿئي ٿو. هي ڪينئن جنهن کي عام ٻولي ۾ گلابي ڪينئن به چئجي ٿو. گلابي ڪينئن جنهن جو سائنسي نالو پيڪٽينوفوروگوسپائلا آهي، ڪيڙن جي خاندان گيلي چڊي سان تعلق رکي ٿو. هي ڪينئن وونئڻ جي فصل جي گل، مڪڙن ۽ گوڙن کي کائي ناس ڪري ٿو. هڪ اندازي موجب هي ڪيڙو ڪپھ جي پيداوار کي 20 کان 30 سيڪڙو نقصان ڏي ٿو. هن ڪيڙي جي نقصان جي ڪري پاڪستان ۾ سالانه 10 لک ڪپھ جون گهٽتايون گهٽ ٿين ٿيون. هي ڪيڙو نه صرف ڪپھ جي پيداوار گهٽائي ٿو پر ڪپھ جي معيار کي به گهٽائي ٿو جنهن جي ڪري مارڪيٽ ۾ اسان جي ڪپھ کي گهربل اگھ به نٿو ملي. سنڌ ۾ گلابي ڪيڙي جو حملو اڪثر ڪري وونئڻ جي شروعاتي مرحلي يعني اپريل، مئي جي مهينن ۾ ٿئي ٿو پر هن ڪيڙي جو شديد حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر جي مهينن ۾ ڏٺو ويو آهي. هن ڪيڙي جون هڪ سال ۾ عموماً 4 کان 6 پيڙهيون ٿين ٿيون، هن جي مادا 150 کان 200 آنا ڪپھ جي گلن، گوڙن ۽ مڪڙن تي لاهي ٿي، جنهن مان 7 ڏينهن جي اندر

ڪيڙا ڦٽن ٿا ۽ آني مان نڪرندڙ ڪيڙو هڪ ڪلاڪ جي اندر گل يا گوڙي ۾ سوراخ ڪري اندر داخل ٿي ٿو. گوڙي جي اندر داخل ٿي ڪري هي ڪيڙو سڀ کان پهريائين سوراخ کي بند ڪري پوءِ اندران ئي اندران ڪپھ جي گل ۽ گوڙي کي کائيندو رهي ٿو. جڏهن هي ڪيڙو ڪپھ جي گل ۾ داخل ٿئي ٿو ته گل کي پنڪڙين کي اندران هڪ مادي جي مدد سان بند ڪري ٿو جنهن سان گل مائڊاڻي جي شڪل وانگر نظر ايندو آهي. گوڙي ۽ گل جي اندر بند هجڻ جي ڪري زهرن سان هن ڪيڙي تي ضابطو ڪرڻ تمام گهڻو ڏکيو آهي. ۽ گلابي ڪينئن جي حملي وارو گوڙو صحيح طريقي سان ٽڙي نه سگهندو آهي. پوءِ اهو ڪينئن 10 کان 14 ڏينهن اندر پنهنجي لارو يا ڪينئي وارو مرحلو پورو ڪري زندگي جي اڳئين مرحلي يعني سوٽ ۾ داخل ٿئي ٿو. جتي هي پهچي پاڻ کي هڪ خول ۾ بند ڪري ٿو. اهو مرحلو گهڻو ڪري گوڙي مان ٻاهر نڪري ڪري هيٺ زمين تي يا سڪل پنن وغيره تي گذاري ٿو، پوءِ 10 کان 12 ڏينهن اندر پيوپا يا خول مان بالغ پروانو ٿي نڪري ٿو. جيڪي پروانو وري اڳتي جنسي ميلاپ ڪري آنا لاهين ٿا ۽ زندگي جي روانگي کي جاري رکڻ ٿا.

گلابي ڪيڙي جي هڪ خاص خاصيت اها به آهي ته هي ڪيڙو سياري جي موسم هائبرنيشن (بغير کائڻ پيئڻ جي ننڊ سمهڻ) ۾ 3 کان 4 مهينا گذاري ٿو. هائبرنيشن لاءِ گلابي ڪيڙو ڪپھ جي ڪن ڪچري، سڪل پنن، گوڙن، سونگڙن، جنگل ڪارخانن جي ٻاهراڇيل ڪپھ جي ڪچري، سڪل واٽانين جيڪي اڪثر ڪري اسان جا آبادگار زمين ۾ ئي رکندا آهن ۽ سڄو سال مودي رڪندڙ وونئڻ جي فصل ۾ سيارو گذاري ٿو. جئين مٿي ذڪر ڪيل آهي ته زهر سان هن ڪيڙي تي ضابطو ڪرڻ تمام ڏکيو آهي.

گلابي ڪيڙي کي ڪنٽرول ڪرڻ جا ماحول دوست طريقا.

1. جنسي ڦٽڻ جو استعمال (Sex Pheromone Traps).

گلابي ڪينئن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ عام طور تي زرعي زهرن جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. جيڪو هڪ تمام مهانگو ۽ ماحول دشمن طريقو آهي. جيئن ته گلابي ڪينئن آني مان نڪرڻ بعد هڪ

ڪلاڪ جي اندر گوگڙي اندر هليو ٿو وڃي سو هن تي زهر وسيلي ضابطو ڪرڻ تمام ڏکيو آهي. گلابي ڪينٽي تي ضابطي ڪرڻ جو هڪ ماحول دوست طريقو جنسي ڦٽند (Sex Pheromone Trap) جو استعمال آهي. جيئن ته گلابي ڪينٽي جي مادي جڏهن جنسي ميلاپ (Mating) ڪرڻ جي خواهش ڪري ٿي ته هڪ فيرامون (Pheromone) يا خوشبو ڇڏي ٿي ۽ پوءِ هن خوشبو تي نر پروانه (Male Moths) ڇڪجي اچن ٿا ۽ مادي سان ميلاپ ڪن ٿا. ان کان بعد مادي بيضا (Eggs) لاهي ٿي ۽ جنهن مان ڪينٽان نڪري ڪري گوگڙن کي کائين ٿا. زرعي سائنسدانن اها ساڳئي خوشبو/فيرامون هٿرادو طريقي سان ٺاهي ورتو آهي ۽ هن فيرامون يعني هٿرادو خوشبو جا ڪئپسول مارڪيٽ ۾ آساني سان دستياب آهن. هڪ ايڪڙ ۾ 6 کان 8 ڪئپسول لڳايا ويندا آهن. ڪئپسول هڪ خاص قسم جي برني ۾ لڳايو ويندو آهي جنهن کي ٿرپ سڏبو آهي، جيڪڏهن ٿرپ (برني) دستياب نه هجي ته ڪئپسول کي 1.5 ليٽر پاڻي واري خالي بوتل کي ڪٽي، هن ۾ ٻه لڳائي سگهجي ٿو. خالي بوتل جي مٿئين حصي ۾ ٻه سوراخ ڪبا جنهن ۾ ڪئپسول لڳائبو ۽ بوتل جي هيٺئين حصي ۾ صرف مليل پاڻي وجهبو ته جئين ڇڪجي ايل نر پروانا پاڻي ۾ ڪري پون. برني يا بوتل مان هر ٽن ڏينهن کان پوءِ ڦاٿل نر پروانن کي ٻاهر ڪڍي تازو پاڻي ڀرجي پاڻي ٻاهر ڪڍڻ مهل ڪنهن ڪپڙي جي مدد سان ڇاڻي وڃي ته جئن پروانن جو تعداد به معلوم ٿي سگهي. هي ڪئپسول هڪ مهيني لاءِ ڪارآمد هوندا آهن، مهيني کان پوءِ به جيڪڏهن ضرورت هجي ته نوان ڪئپسول لڳائجن. نر پروانن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪري گلابي ڪيڙي جي مادي وائي آنا لا هيندي جنهن مان ڪيڙا ڪونه نڪرندي ۽ نتيجي ۾ وڻن جو فصل گلابي ڪيڙي کان محفوظ رهندو.

2. هاري دوست جيتن جو استعمال

گلابي ڪيڙي کي کائيندڙ هاري دوست جيتن جي سڃاڻپ به تمام ضروري آهي. ڪافي اهڙا هاري دوست جيت موجود آهن جيڪي گلابي ڪيڙي کي قدرتي طور کائي ناس ڪن ٿا. جهڙوڪ ليڊي برڊ بيٽل (تنبڻيون)، ڪرائيسوپا، ايپن ٽيلس (ڪڪر جهڙو منگهڙ)، اورٽيس بگ (وڏين اکين وارو منگهڙ)، طفيلي ڪيڙا، ڪوربيٽرو ۽ ڀنڀوري وغيره. اسان جي آبادگارن کي هنن هاري

دوست جيتن جي سڃاڻپ رکڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن هاري دوست جيتن جو تعداد وڌيڪ هجي ته زهرن جو ڦوهارو نه ڪجي. اهي هاري دوست جيت قدرتي طريقي سان گلابي ڪيڙي ۽ ٻين نقصان ڏيندڙ جيتن تي ضابطو رکندا.

آبادگار پاڻن لاءِ گلابي ڪيڙي کان بچاءُ جو خاص

هدائيتون

- گلابي ڪيڙي خلاف قوت مدافعت رکندڙ (بي) ٽي جنسن جي چونڊ ڪريو.
- وڻن جي پوکي هميشه شفارس ڪيل وقت تي ڪجي، گهڻو اڳاٽي پوکي به گلابي ڪيڙي جي حملي کي وڌائي ٿي.
- وڻن جي فصل جون بقايا جات، سڪل پن گوگڙا، سونگهڙيون، سڪل واٽانيون وغيره زمين ۾ هرگز نه رکن.
- وڻن جي فصل ختم ٿيڻ تي واٽانيون ڪٽي ساڙي ڇڏجن ۽ ٻنيءَ کي صحيح نموني صاف ڪجي ۽ اڳئين فصل لاءِ زمين تيار ڪجي.
- وڻن جي فصل کي موسم ختم ٿيڻ کان پوءِ وڌيڪ وقت لاءِ زمين ۾ نه بيهارجي. مويي فصل رکڻ کان پري هيز ڪجي.
- وڻن جي فصل جي هر هفتي جانچ پڙتال ڪندو رهجي، جئين ئي ماڏاڻي وانگر گل نظر اچن ته هڪدم زرعي ماهرن سان مشورو ڪجي ۽ مناسب تدارڪ جو طريقو استعمال ڪجي.
- شروعاتي وقت ۾ مانڏاڻي وارن گلن کي هٿ سان پٽي پوءِ ساڙي ڇڏجن يا کڏ ڪوٽي ان ۾ پوري ڇڏجن.
- گلابي ڪيڙي جي ضابطي لاءِ پهريائين صفائي سٿرائي، جنسي ڦٽند جو استعمال، حياتياتي طريقن جو استعمال ڪجي.
- جننگ فيڪٽرين جي ٻاهريان سونگڙين ۽ ڪپهه مان نڪرندڙ ٻئي ڪچري کي محفوظ طريقي سان ساڙي ناس يا ختم ڪجي.
- آخري حل طور جيڪڏهن زهرن جي استعمال وارو طريقو اپنائڻ اٿر هجي ته ڪنهن ويجهي زرعي ماهر کان مشورو ڪري، ماحول دوست زرعي زهر جي چونڊ ڪجي، صحيح مقدار، درست طريقي سان ۽ صحيح وقت تي استعمال ڪجي.



سارين جي فصل تي حملو ڪندڙ جيتن جي سڃاڻپ ۽ انهن تي ضابطو آڻڻ جي حڪمت عملي

ڊاڪٽر شاهنواز ڪهڙو

ڊپارٽمينٽ آف اينٿامولاجي،

فيڪلٽي آف ايگريڪلچرل سائنسز

دي يونيورسٽي آف لاڙڪاڻو

snkhuhro@gmail.com

اسان جي آبادگارن کي سارين جي پوکائي کان پوءِ هفتي ۾ 2 دفعا فصل جو معائنو ڪرڻ گهرجي ته جيئن انهن کي فصل جي ضرورت جي خبر پوي جهڙوڪ جيتن جو حملو، پاڻ جي ضرورت، پاڻي جي ضرورت، گندگاھ جي اچڻ ۽ انهن جي ڪنٽرول لاءِ زرعي آفيسرن سان مشورو ڪرڻ گهرجي.

سارين جي فصل تي اهم جيت جيڪي فصل کي نقصان ڏين ٿا انهن ۾

Brown plant hopper Yellow rice stem borer

Rice ear head bug, Rice grass hopper .

شامل آهن انهن کان علاوه ٻيا به جيت جيڪي Minor insects سڏبا آهن، اهي به حملي آور ٿيندا آهن، جيڪي فصل کي پڻ نقصان پهچائيندا آهن جهڙوڪ Pink stem borer , White stem borer, Rice hispa, Mole cricket , White Backed plant, Thrips, seed bed beetle hopper شامل آهن. سارين جي فصل تي جيڪو وڌيڪ حملي آور جيت آهي Brown Plant hopper جيڪو فصل کي تمام گهڻو نقصان ڏئي ٿو. انهي جيت جا nymph ۽ adult ٻئي فصل کي نقصان ڏين ٿا. ان جيت جو حملو آگسٽ کان آڪٽومبر تائين حملو جاري رهي ٿو.

Yellow stem borer : جيت به سارين جي فصل کي تمام گهڻو نقصان ڏئي ٿو هي جيت صبح جو سوير فصل تي ڏسي سگهجي ٿو. هي جيت فصل جي تيلي کي پاڙون وٺان کائي ڪپي ۽ ڪيرائي ڇڏي ٿو ان کان پوءِ جلدي ڪا Pesticides زرعي ماهرن جي مشوري سان استعمال ڪريو.

Rice ear head bug : جيت به سارين جي فصل کي نقصان ڏئي ٿو هن جو رنگ Green ۽ Light brown ٿئي ٿو هي جيت آگسٽ کان نومبر تائين فصل ۾ موجود رهي ٿو هي

سارين جو فصل پاڪستان ۾ خاص اهميت رکي ٿو ملڪ جي معيشت ۾ ڇاڪاڻ ته ملڪ جي لکين آبادي سارين جي پوک سان لاڳاپيل آهي. سارين جو فصل پاڪستان جي پنجاب صوبي ۽ سنڌ صوبي ۾ پوکيو ويندو آهي جيڪو اسان کي 11.1 Million tonnes پيداوار ڏئي ٿو. سارين جو فصل سنڌ صوبي جي سارين وارن علائقن ۾ پوکيو ويندو آهي، جنهن ۾ (لاڙڪاڻو، دادو، شڪارپور، قمبر شهدادڪوٽ، جيڪب آباد، ڪشمور، ٺٽو، بدين، ۽ ٽنڊو محمد خان) شامل آهن. ملڪ ۾ جيڪي مشهور ساريون پوکيون وينديون آهن انهن ۾ IRR_6, IRR_9, Basmati, karnel Basmati, Basmati_385, KS_282 Basmati Rice چانور مشهور آهي.

دنيا ۾ بچائڻ ۽ کائڻ ۾ جيڪو تمام گهڻو پسند ڪيو ويندو آهي. ان کان علاوه پاڪستان ۾ hybrid چانورن جي پوکائي جو رجحان به وڌندو ٿو وڃي، جنهن جي پيداوار اسان جي جنسن کان 30% وڌيڪ آهي اسان جي آبادگارن کي سارين جي پوکائي کانپوءِ ڪيترين ئي انيڪ مسئلن کي منهن ڏيڻو پوي

جيت فصل ۾ صبح کان شام تائين فصل ۾ موجود رهي ٿو ۽ جيڪڏهن گرمي گهڻي ٿي وڃي ٿي ته فصل جي ڇانو ۾ لڪي وڃي ٿو هي جيت جڏهن ڇانورن جو داڻو ٺهي ٿو ۽ Milky stage ۾ آهي ته ان مان رس چوسي ٿو ۽ داڻي کي نقصان ڏئي ٿو. ان جيت کي ختم ڪرڻ لاءِ light traps استعمال ڪرڻ گهرجي يا وري ان کي نيت وسيلي Collect ڪجي جيڪڏهن توهان ان جيت جي 10 Panicles/100 bugs تي موجودگي هجي ته فورن ويجهي ذريعي ماهرن سان مشورو ڪجي ۽ سني Pesticides استعمال ڪرڻ گهرجي.

Rice Hispa: جيت ٻه فصل تي تمام گهڻو ملي ٿو هن جو رنگ گهڻو ڪري ڪاري رنگ جو ٿيندو آهي ۽ فصل جي Leaf minor وانگر نقصان ڏيندو آهي هن جيت جو نقصان نرسري کان شروع ٿيندو آهي ۽ وري سارين جي main فصل تائين نقصان جاري رهندو آهي هن جيت کي نرسري ۾ پاڻي گهڻو ڏيڻ سان اهي پاڻي ۾ مري وينديون آهن ۽ انهن جي تعداد کي گهٽائي سگهجي ٿو ان جيت جي موجودگي جي صورت ۾ 2-5 lit Spray 20EC chlorpyriphos وري ذريعي ماهرن جي مشوري سان ڪا سني دوا مارڪيٽ ۾ موجود هجي ته ان جو استعمال ڪجي.

Rice Grasshopper

هي جيت اڪثر ڪري ٻين فصلن ۾ موجود هوندو آهي ۽ اتان وري سارين جي فصل تي حملو ڪندو آهي ۽ فصل جي Leaves کي کائيندو آهي هي جيت سارين جي فصل کي آگسٽ ۽ سيپٽمبر ۾ تمام گهڻو نقصان پهچائيندو آهي هي گهڻو ڪري فصل جي ڪنارن تي تمام گهڻو موجود هوندو آهي هن جيت کي 20EC Chlorpyriphos جو اسپري ڪجي يا وري ذريعي توسيع کاتي جي ذريعي ماهرن کان مشورو وٺي ڪنهن سني ڪمپني جي دوا استعمال ڪرڻ گهرجي.

سارين جي پيداوار وڌائڻ لاءِ ضروري آهي ته آبادگارن کي جيتن تي ضابطو ڪرڻ لاءِ مختلف ۽ زهرن کان پاڪ اپاءَ وٺڻ گهرجن ذريعي کوجنا مان معلوم ٿيو آهي ته سارين جي فصل کي اڪثر ڪري 18% کان 20% جيتن جي حملي جي ڪري ٿيندو آهي آبادگارن ان نقصان کي گهٽائڻ لاءِ Pesticides جو استعمال تمام گهڻو ڪري ٿو جيڪو فصل جي تيار ٿيڻ تائين جاري رهي ٿو ان جو نتيجو اهو نڪري ٿو ته انهن Pesticides جو اثر ڇانورن جي داڻن ۾ موجود رهي ٿو جيڪو دنيا جي سائنسدانن کوجنا ڪري معلوم ڪيو آهي سائنسدانن وڌيڪ ٻڌايو ته انهن زهرن جو اثر جيڪو ڇانورن جي داڻي ۾ رهي ٿو اهو وڌيڪ خطرناڪ آهي انسان ذات جي صحت لاءِ جڏهن هو ڇانورن کي کائڻ لاءِ استعمال ڪري ٿو ۽ اهو ڇانور جڏهن اسان دنيا جي مختلف ملڪن ڏانهن Export ڪيون ٿا ته اهو ڇانور ٻاهرين ملڪن کان Reject ٿي واپس اچي ٿو، ان جو نقصان ملڪ کي ۽ ملڪ جي آبادگارن کي ٿئي ٿو ان کان علاوه ملڪ جي پڻ بدنامي ٿئي ٿي ڇو ته اسان جيڪي Pesticides استعمال ڪيون ٿا اهي Toxic آهن، انسان صحت لاءِ، آبهوا لاءِ ۽ جانورن لاءِ پڻ اثر رکن ٿيون تنهنڪري اهو چئيلينج ٿي ويو آهي، اسان جي سائنسدانن لاءِ ته اهي Identity ڪن.

Novel Management Practices: هڪ اهڙي حڪمت عملي آهي، جيڪا سارين جي فصل تي حملو ڪندڙ جيتن تي ضابطو آڻي سگهي.

اسان جي ملڪ لاءِ اهو بهتر ٿيندو ته سارين جا آبادگار IPM تي عمل ڪن ۽ وڌ ۾ وڌ پيداوار حاصل ڪري ملڪ جي معيشت ۽ پنهنجي گهر جي معيشت ۾ بهتري آڻي سگهن.



پاڇين جي افاديت وڌائڻ جا سونهري اصول

ابرار احمد مجيد اٿو

زرعي توسيع تعلقہ ٽنڊوالهيار

اٿپورا وسيل، واپاري، گراهڪ جي پسند ناپسند شامل آهي.

پاڇين جي پيداوار وڌائڻ جا ڪجهه سونهري اصول هيٺ ڏجن ٿا.

1. پاڇين جي افاديت وڌائڻ جو پهريون اصول اهو آهي ته ”گراهڪ“ شين جي افاديت ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري، ڇاڪاڻ ته گراهڪ ئي شين جي ڪوئالٽي جي تعين ڪري ٿو. جنهن سان پيداواري شين کي موت ملندي.
2. پاڇين جي افاديت وڌائڻ لاءِ ”واپاري“ جو اهم ڪردار آهي. واپاري شين جي ڪوئالٽي ۽ اگهه وڌائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.
3. پاڇين جي افاديت وڌائڻ ۾ ”هاري“ جو به اهم ڪردار آهي. هاري ٻين هارين کان مختلف ڪم ڪري پنهنجي پيداوار جي افاديت ۽ ڪوئالٽي ۾ بهتري آڻي ٿو.
4. پاڇين جي افاديت وڌائڻ لاءِ واپاري جي ڳولا ڪريو، جيڪو هاري جي بهتر پيداوار کي ساراهي ۽ ان جي قدر قيمت وڌائڻ هر طرح سان سهڪار ڪري، جنهن سان هاري کي پيداوار جا سٺا اگهه ملندا.
5. پاڇين جي افاديت وڌائڻ لاءِ بهتر ماڻهن جي چونڊ ڪريو جيڪي فارم جي پيداواري صلاحيت ۽ ڪوئالٽي بهتر بنائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن.
6. مارڪيٽ توڙي واپارين وٽ پنهنجو اعتماد بحال رکڻ، سٺي ساڪرڪنڊڙ آبادگار مارڪيٽ يا واپارين کان سٺا اگهه حاصل ڪري ٿو.

پاڇين جي افاديت هڪ اهڙو طريقو ڪار آهي جنهن وسيلي آبادگارن کي پوکي کان وٺي لاپاري کان پوءِ واري ٽيڪنالاجي ”پوسٽ هارويست ٽيڪنالاجي“ تائين ڄاڻ فراهم ڪئي وڃي ٿي. ان کان پوءِ پنهنجي پيداوار جي درجہ بندي ڪري بهتر مارڪيٽ جي ڳولا ڪري آبادگار کي بهتر اگهه ڏياريا وڃن ٿا. اهڙي طرح پيداوار پنهنجي آخري گراهڪ تائين پهچي ٿي.

پاڇين جي افاديت کي بهتر بنائڻ لاءِ بهتر پيداواري ٽيڪنالاجي، نئين جنسن، صحت مند زمين ۽ پوکي سان گڏ بهتر لاپاري کان پوءِ واري ٽيڪنالاجي جو هئڻ تمام ضروري آهي، انهيءَ سان گڏ بهتر مارڪيٽنگ نظام گڏيل ڪميونٽي وارا طريقڪار لازمي آهي، جنهن وسيلي آبادگار گڏجي پنهنجي پيداوار مان بهتر اگهه حاصل ڪري سگهن ٿا.

انهي سڄي نظام يا طريقو ڪار ۾ گهٽ پيداواري ڄاڻ، مڊل مين ۽ ڪميشن ايجنٽ جي موجودگي، مارڪيٽ تائين رسائي، درجا بندي نه ڪرڻ ۽ گڏيل ڪميونٽي نظام جو نه هئڻ جهڙا مسئلا اچي وڃن ٿا. انهيءَ کان علاوه گهٽ پيداوار، خراب ڪوئالٽي، گهٽ اگهه،

گهر ۽ اوطاق جي اڱڻ ۾ يا ڇت تي ڀاڄيون ۽ ساوا مصالحه پوکڻ جي اهميت ۽ طريقا

ڊاڪٽر اسلام الدين مجيدائو

ايگريڪلچر ريسرچ سينٽر، ٽنڊوڄام

himajeedano@gmail.com

سڀ کان پهرين انهي ڳالهه تي اچون ته جڏهن بازار يا مارڪيٽ مان ڀاڄيون ملن ٿيون ته پوءِ گهر ۽ اوطاق جي اڱڻ تي ڀاڄين پوکڻ جي ضرورت ڪهڙي آهي؟

انهي جو سبب اهو آهي ته مارڪيٽ جون ڀاڄيون پاروٽيون، گدلاڻ واريون ۽ انهن مٿان زرعي زهر لڳل هوندو آهي، جيڪي انساني صحت لاءِ نقصان واريون ٿين ٿيون. اسان تائين پهچڻ ۾ ڀاڄين جو چوٽائي حصو کائڻ لائق نٿو رهي ۽ ڀاڄيون مهانگيون پڻ ملن ٿيون. انهي لاءِ اهو ضروري ٿي پيو آهي ته ڀاڄين کي پنهنجن هٿن سان پوکجي، جيڪي تازيون، زهرن کان پاڪ ۽ گدلاڻ کان آجئون هونديون آهن. ان کانسواءِ ڀاڄين اندر کائڻ وارن لاءِ ذائقو سٺو ۽ لحمت، حياتين ۽ معدني جزن سان ڀرپور پڻ هونديون آهن. جڏهن ته ڊاڪٽر پڻ تجويز ڪن ٿا ته سائين ڀاڄين کي پنهنجي خوراڪ ۾ شامل ڪيو وڃي. سائين ڀاڄين کي ربيع (سياري) ۽ خريف (اونهاري جي موسم ۾ پوکيو وڃي ٿو. جڏهن ته خريف جون ڀاڄيون بهار ۽ سائونڊ جي موسم ۾ پڻ پوکجن ٿيون. سياري جي ڀاڄين ۾ بندگوبي، گل گوبي، بصر، سلاڊ، موري، پيز، پيتائي گجر، پالڪ، ميٿي، ڏاٽا، ٿوم ۽ گوگڙو شامل آهن. جڏهن ته اونهاري جي ڀاڄين ۾ ٽماٽو، مرچ، پينڊي، واڱڻ، ونگو، توريون، ڪدو ۽ ڪريلو، پينو ۽ ميهو وغيره پوکجن ٿا.

پوکي واري طريقي جي بنياد تي ڀاڄين جي درجه بندي

الف: ٻج جي ذريعي پوکڻ واريون ڀاڄيون

سياري جي موسم ۾ موري، گوگڙو، گجر، پالڪ، ڏاٽا، ميٿي ۽ پيز جڏهن ته گرمي جي موسم ۾ پينڊي، ڪريلو، ونگا، چانهين ۽ گدرو وغيره کي زمين ۾ ٻج جي ذريعي پوکيو وڃي ٿو.

ب: نرسري (پيچاري) جي ذريعي پوکڻ واريون ڀاڄيون

ٽماٽو، مرچ، شملا مرچ ۽ واڱڻ کي گرمين ۾ جڏهن ته گل گوبي، بند گوبي، بصر ۽ سلاڊ سياري جي موسم ۾ نرسري (پيچاري) جي ذريعي پوکڻ واريون ڀاڄيون آهن. گرمي جي موسم ۾ ولين واريون ڀاڄيون جهڙوڪ توري، ڪدو، ميهو، ونگا وغيره جي آڳاٽي نرسري پلاسٽڪ جي ٿيلمين ۾ لڳائي سگهجي ٿي جنهن سان بيٺي پيداوار ممڪن آهي.

ت: نباتاتي حصن جي ذريعي پوکڻ واريون ڀاڄيون

اروي، پٽاٽو، ٿوم، هيڊ، ادرڪ ۽ قودنو نباتاتي حصن مان پوکجڻ واريون ڀاڄيون آهن.

گهريلو باغيچي جي منصوبندي: ڀاڄين جي لاءِ اهڙي جڳهه چونڊي وڃي جتي ٻوٽن کي ڏينهن جو گهٽ ۾ گهٽ ڇه ڪلاڪ سج جي روشني مان فائدو ملي سگهي. جيڪڏهن اوهان جي اڱڻ يا باغيچي جو اهڙو حصو جتي گهڻي دير چانوءَ رهندي هجي ته اهڙي جڳهه تي پٺن واريون ڀاڄيون مثال طور ڏاٽا، قودنو، پالڪ ۽ سلاڊ وغيره پوکجي. پوکي جي لاءِ چونڊيل حصي جي ماپ ڪجي ته جيئن اوهان کي اندازو ٿي سگهي ته ان حصي جي لاءِ ڪيترو پاڻ ۽ ٻج جي ضرورت ٿي سگهي ٿي. زمين جي ماپ کانپوءِ پنهنجي ضرورت، پسند ۽ موسم کي ڌيان ۾ رکندي مختلف ڀاڄين جي لاءِ ايراضي مخصوص ڪري ڇڏيو. ڪجهه ڀاڄيون جهڙوڪ ڏاٽا، قودنو گهٽ ايراضي ۾ به گهر جي ضرورت پوري ڪري سگهن ٿا جڏهن ته ٻين ڀاڄين کي گهڻي ايراضي جي ضرورت ٿئي ٿي.

پوکي کان پهرين ڪاغذ تي هڪ خاڪو ٺاهي ان ۾ چونڊيل ڀاڄيون لکي ڇڏيو اهڙي طرح خاڪي ۾ ڀاڄين جون قطارون، ٻوٽن جو فاصلو، پاڻ جي ضرورت وغيره درج ڪري ڇڏيو ته جيئن زمين جي تياري وقت مشڪل نه ٿي سگهي. ولين واريون ڀاڄيون مثال طور ڪدو، پيز وغيره حفاظتي ڪناري سان گڏ پوکيو ته جئين ولين کي ڪناري تي چاڙهيو وڃي ڀاڄين جي قطارن جو رخ سياري ۾ اتر ڏکڻ ڏانهن رکي ته جيئن سج جي روشني دير تائين ملي سگهي ڀاڄين کي پالتو جانورن مثال طور ڪڪڙ، سها (خرگوش) وغيره کان بچائڻ جي لاءِ ايراضي جي چوڌاري حفاظتي ڪناري جو انتظام ڪيو. پڪين جهڙوڪ طوطو ۽ جهرڪيون وغيره سان پيز ۽ ٻين ڀاڄين کي بچائڻ جي لاءِ

ايراضي ۾ ڇمڪيلين پتين جي ٻڌڻ سان پکي ڀاڄين کان پري رهن ٿا. هڪ ئي خاندان جون ڀاڄيون هڪ ئي جاءِ (ايراضي) ۾ ساڳي جڳهه تي نه پوکيو ته جيئن جيتن ۽ بيمارين جي حملي جي شدت ۾ گهٽتائي رهي مثال طور ولين واريون ڀاڄيون (ڪڍو، توري وغيره) ۽ پٽاٽو، ٿماتو ۽ مرچ هڪ ئي خاندان سان تعلق رکن ٿا.

زمين جي تياري ۽ پاڻ جو استعمال

زمين جي تياري: ڀاڄين جي پوکي جي لاءِ زمين جو مٿانئون حصو (9 کان 12 انچ) انتهائي اهميت وارو آهي. ڇاڪاڻ ته انهي حصي مان ٻوٽي کي خوراڪ ۽ پاڻي حاصل ڪرڻو آهي انهي لاءِ هن جي سٺي تياري ۽ زرخيزي انتهائي ضروري آهي. ڀاڄين جي پوکي جي لاءِ لٽياسي زمين انتهائي مناسب سمجهي وڃي ٿي جيڪڏهن باغيچي جي ايراضي ۾ چيڪي مٽي يا وارياسي زمين هجي ته ايراضي کي پوکي لائق ٺاهي سگهجي ٿو. انهي لاءِ سخت زمين يا چيڪي مٽي واري زمين ۾ واري ۽ پاڻ وڌيڪ مقدار ۾ ملائي پوک جي قابل بڻائي سگهجي ٿو. عام مٽي ۽ پاڻ وڌيڪ مقدار ۾ ملائي پوک جي قابل بڻائي سگهجي ٿو. زمين جي سٺي تياري جي لاءِ هڪ فوٽ گهرائي تائين زمين کي وري وري گڏيو. زمين ۾ موجود پٿر، پلاسٽڪ وغيره ٻاهر ڪڍو، مٽي جي پٿرن کي ٽوڙي نرم ۽ پيريو ڪري ڇڏيو. مڪمل تياري تي مٽي جو پيريو ۽ نرم هجڻ ضروري آهي ته جيئن ٻوٽن جون پاڙون سٺي طرح زمين اندر پڪڙجي سگهن ۽ ٻوٽا زمين مان وڌيڪ خوراڪ ۽ پاڻي وغيره حاصل ڪري سگهن.

پاڻ جو استعمال: ٻوٽن جي واڌوبجهه جي لاءِ نانٽروجن جي ضرورت پوي ٿي. نانٽروجن پٺن ۽ ٻوٽي جي قد ۽ پکيڙ جي لاءِ انتهائي ضروري جزو آهي. فاسفورس ٻوٽن جي پاڙن جي مضبوطي ۽ پکيڙ جي لاءِ انتهائي اهم جزو آهي. فاسفورس ٻوٽن ۾ مختلف بيمارين جي خلاف قوت مدافعت به پيدا ڪري ٿو، اهڙي طرح سان پوٽاشيم جي موجودگي ۾ ٻوٽا نانٽروجن ۽ فاسفورس جو صحيح فائدو وٺي سگهن ٿا. ان کانسواءِ ميوي ۽ ٻج جي صحت مند واڌوبجهه ۽ سٺي خاصيت جي لاءِ پوٽاشيم انتهائي اهم آهي. انهي ٽنهي جزن نانٽروجن، فاسفورس، پوٽاشيم کانسواءِ ٻيا به عنصر مثال طور ڪيلشيم، فولاد، بوران وغيره به انتهائي گهٽ مقدار ۾ ٻوٽن جي ضرورت ٿين ٿا. جيئن ته اهي سڀئي عنصر مختلف ڪيميائي پاڻن جي صورت ۾ بازار ۾

موجود آهن پر گهريلو باغيچي جي لاءِ اهو ممڪن نه آهي ته ايڏو پاڻ گڏ ڪيو وڃي جڏهن ته وٽان جي پاڻ ۾ اهي سڀ جزا موجود آهن. قدرتي پاڻ ۾ اهي سڀ جزا موجود آهن، قدرتي پاڻ جنهن ۾ ڇيٽو ۽ پٺن جو پاڻ شامل آهي، جيڪو نه صرف ٻوٽن لاءِ ضروري غذائي جزا فراهم ڪري ٿو بلڪه زمين جي مٿانهين سطح کي به بهتر بڻائي ٿو.

وٽاڻ جو پاڻ: هن ۾ جانورن ۽ ڪڪڙن جون وٺيون شامل آهن، وٽاڻ جي پاڻ کي زمين جي تياري وقت شامل ڪريو. خيال رکڻو ته پاڻ چڱي طرح گريل سڙيل ۽ پراڻو پاڻ استعمال ڪريو. تازو وٽاڻ جو پاڻ زمين ۾ وجهڻ سان اڏو هي لڳڻ جو خطرو آهي ۽ تازي پاڻ سان ٻوٽن کي خوراڪ حاصل نٿي ٿئي. وٽاڻ جي پاڻ کي کڏن ۾ به يا ٽي مهينا بند ڪري ڇڏيو يا زمين جي مٿاڇري تي ان مٿان مٽي جو ته ڏئي ڍڪي ڇڏيو ته پاڻ تيار ٿي ويندو.

پٺن جو پاڻ: ٽي کان چار فوٽ اونهو کڏو کوٽيو، هن کڏي ۾ پٺن، ڀاڄين، ميون ۽ بيضن جون ڪلون ۽ ڳرڻ سڙڻ وارن ٻين شين جو هڪو ته ڏئي ڇڏيو، هن ته جي مٿان وٽاڻ جي پاڻ جو ته، لڳايو، اهڙي طرح سان ڪيترائي ته لڳائي کڏو پري ڇڏيو. آخر ۾ کڏي کي مٽي جي ٿلهي ته سان بند ڪريو تقريباً ٻه يا ٽي مهينا گذرڻ کانپوءِ پاڻ استعمال جي لاءِ تيار ٿي ويندو. ڇيٽي ۽ پٺن جي پاڻ کي گهرج موجب استعمال ڪندا رهو.

ڪيميائي پاڻ: ڪيميائي پاڻ بازار ۾ دستياب آهن، مختلف عنصرن جي لاءِ گهريلو باغيچي جي لاءِ ڇيٽي ۽ پٺن جي پاڻ کي ترجيح ڏني وڃي. ڪيميائي پاڻن جي استعمال کان پاسو ڪريو، جيڪڏهن اوهان جي باغيچي جي زمين گهٽ طاقت واري به آهي ته نامياتي پاڻ وڌيڪ مقدار ۾ استعمال ڪرڻ سان زمين طاقتور ٿي ويندي. زمين ۾ پاڻ وجهي چڱي طرح سان گڏ ۽ دڙ ڪريو جيئن پاڻ زمين ۾ ملي وڃي، هاڻي ڀاڄيون لڳائڻ لاءِ زمين کي سنوت ۾ آڻيون ۽ ڀاڄين جي قسم جي مطابق ڪرين، پٽڙين ۽ ٻارين ۾ ڀاڄين جي پوک ڪريو.

ڪريا ٺاهڻ جو طريقو: پينڊي، مرچ، ٿماتو، شملو مرچ، واڱڻ، گل گوٻي، بند گوٻي، موري، گوگڙو، گجر ۽ سلاد ڪرين تي پوکڻ سان سٺي پيداوار ڏين ٿيون. نرم ۽ سڌي زمين تي رسي جي مدد سان سڌا نشان لڳايو، قطارن جي فاصلي جي لاءِ ڪئلينڊر ڏسو. هاڻي

نشان جي ٻنهي طرفن کان مٿي ڪٽي نشان جي مٿان وجهندا وڃو. هن عمل سان جيڪو اڀار ايندو اهي ڪريا سڏبا، ڪرين جي وچ ۾ پاڻي ڏيڻ لاءِ نالي ٺهي ويندي.

پٿڙيون ٺاهڻ جو طريقو: تمام وڏن واريون يا جيون مثال طور ڪڍو، ونگا، چانهين، گدرو ۽ پيز (مٿر) پٿڙين تي پوکيون وڃن ٿيون، جيڪڏهن انهن يا ٻين کي ڪناري جي ويجهو پوکيو وڃي ۽ سهارو ڏنو وڃي ته پٿڙين جي ضرورت نه رهندي. پٿڙين جي لاءِ به نشان هڻي مٿي ڪٽي ڇڏيو ته جيئن سڌيون پٿڙيون ٺهي سگهن، پٿڙيون ڪرين جي پيٽ ۾ وڌيڪ ويڪريون ٿين ٿيون.

ٻارين ۾ پوک: پالڪ، ميٿي، ڌاڻا، ٿوم، بصر ۽ قودني کي ٻارين تي قطارن ۾ پوکيو وڃي ٿو. قطارن ۾ پوکڻ سان گندگهه جي روڪ ٿام سان گڏ پاڻي ڏيڻ ۾ به آساني ٿئي ٿي، ان کان علاوه ٻوٽن کي برابر حصي ۾ سج جي روشني، خوراڪ ۽ پاڻي به حاصل ٿئي ٿو.

پوکي جو طريقو: عام طرح سان يا جيون ٽن طريقن سان پوکيون وڃن ٿيون. الف. بچ وسيلي ب. نباتاتي حصن وسيلي ت.

بيجاري وسيلي

الف. بچ وسيلي: زمين جي چڱي طرح تياري ڪرڻ کانپوءِ ضرورت جي مطابق زمين ۾ ڪريا، پٿڙيون يا ٻارين ۾ قطارن جا نشان لڳايو. سفارش ڪيل فاصلن جي مطابق بچ وسيلي پوکڻ واريون يا جيون مثال طور پينڊي، ونگو، ڪريلو، توري، ميهه، ڪڍو، گدرو، چانهين کي گرمي جي موسم ۾ جڏهن ته موري، گوگڙو، گجر، ميٿي، پالڪ وغيره سياري جي موسم ۾ بچ وسيلي پوکيون وڃن ٿيون. هڪ جڳهه تي طاقت وارو سٺو هڪ بچ پوکيو بچ کي ان جي قد کان ٿيڻ تي گهرائي ۾ لڳايو، گهڻو ڪري قوهاري سان پاڻي ڏجي. بچ ڦٽڻ جي ڪجهه ڏينهن کانپوءِ هڪ جڳهه تي هڪ ٻوٽو ڇڏي باقي اضافي ٻوٽن جي ڇڏائي ڪري ڇڏيو ته جيئن ٻوٽا صحت مند ٿي سگهن واڌويجهه ڪري سگهن.

ب. نباتاتي حصن وسيلي پوک: ڪجهه يا جيون ڏانڊي يا پاڙ جي حصي مان پوکيون وڃن ٿيون. انهن يا ٻين ۾ پٽاٽو، ارو، ٿوم ۽ لاهوري گجر شامل آهن.

پٽاٽو: سنڌ ۾ پٽاٽي جي پوک سيپٽمبر ۾ ٿئي ٿي. پٽاٽي کي اهڙي طرح ڪٽيو جو هر ٽڪري (حصي) تي ٻه يا ٽي اکيون هجن،

انهن ٽڪرن کي بچ جي طور تي زمين ۾ لڳايو. پٽاٽي کي ڪرين تي پوکيو. ڪرين جي وچ وارو فاصلو اڍائي فوٽ جڏهن ته ٻوٽي کان ٻوٽي جو فاصلو 10 انچ رکو.

ارو: ارو جي وچولي جسامت جي ڳنڍن کي بچ جي طور تي استعمال ڪريو. ڪرين جو وچولو فاصلو ٻه فوٽ جڏهن ته ٻوٽن جو پاڻ ۾ فاصلو 10 انچ رکو. ارو کي فيبروري ۾ پوکيو وڃي ٿو.

لاهوري گجر: لاهوري گجر جو (ڪاٺ وارو حصو) فيبروري ۾ واري ۾ پوري ڇڏيو، واري کي اهڙي قدر پاڻي ڏيندا رهو جيئن واري آلي حالت ۾ رهي. لاهوري گجر مان وليون نڪرڻ شروع ٿي وينديون. مارچ ۾ انهن ولين کي ڪٽي 4 کان 6 انچ جا قلم تيار ڪري ڇڏيو. ولين جا ٽڪرا آگست ۾ لڳايا وڃن، انهن ولين کي ڪرين تي پوک ڪريو ۽ پاڻي ڏئي ڇڏيو. شروعات ۾ انهن جون پاڙون نه هڻڻ ڪري اهي مرجهايل نظر اينديون پر ڪجهه ڏينهن ۾ ٻوٽا پاڙون ٺاهي وٺندا. اها ڳالهه ياد رکو ته لاهوري گجر واري ٻني ۾ وٽاڻ جي پاڻ جو استعمال نه ڪريو.

ٿوم: ٿوم جون ڳڙيون بچ جي طور تي استعمال ٿينديون. ڳڙين کي الڳ الڳ ڪري ڇڏيو، سڌي زمين تي قطارن کان قطارن جو فاصلو 8 انچ، جڏهن ته ٻوٽن جو فاصلو 2 کان 4 انچ رکندي ٿوم کي آڪٽوبر ۾ پوکيو وڃي. ٿوم ۾ جيتري گڏ ڪندا اوتري پيداوار وڌيڪ ٿيندي.

قودنو: قودني جون پاڙون سڌي مٽاچري تي قطارن ۾ پوکيو، قودني جي سٺي پڪيڙ جي لاءِ زمين جو نرم هٽڻ ۽ سٺي مقدار ۾ وٽاڻ جي گريل سٽيل پاڻ جو هٽڻ ضروري آهي.

ت. بيجاري وسيلي يا ٻين جي پوک: گريل سٽيل وٽاڻ جو پاڻ، واري ۽ عام مٽي چاڻي برابر مقدار ۾ ملايو. انهي کي ڪونڊين، ڪريٽ يا پلاسٽڪ جي ٽري وغيره ۾ پري ڇڏيو. انهي جي اندر مرچ، ٽماٽو، واڱڻ، سلاڊ، بصر، گل گوٻي، بند گوٻي وغيره جا بچ لڳائي قوهاري سان پاڻي ڏيو. ڪجهه ٽي هفتن ۾ ٻوٽا نڪري ايندا. مناسب جسامت وارا ٻوٽا صبح يا شام جي وقت باغيچي ۾ منتقل ڪريو.

ب. مرچ، ٽماٽو، شلا مرچ ۽ واڱڻ جو اڳاٽو بيجارو تيار ڪرڻ جي لاءِ ڊسمبر ۾ ڪونڊين يا ٻارين ۾ بچ لڳايو. انهن ٻارين جي مٿان ڪجي

جون چڙيون ۽ ٻيون نرم ڪاٺيون جيڪي مڙي سگهن، انهن مان تئل(سرنگهه) ٺاهيو. تئل کي شفاف پلاسٽڪ سان ڍڪيو ته جيئن روشني ٻوٽن تائين پهچي سگهي. ٻنپهرن جو پلاسٽڪ هٽائي پاڻي ڏيو ۽ انهي دوران گند ڪا به صفائي ڪريو.

ج. ولين وارين پاڇين جي آڳاٽي فصل جي لاءِ ٻيجارو، اهڙي علائقي ۾ جتي سردي گهڻي عرصي تائين رهندي هجي. گرمين جون پاڇيون مثال طور ونگو، ڪڍو وغيره جي پوک ۾ گهڻي دير ٿئي ٿي، جنهن جي تدارڪ جي لاءِ طريقو (ب) ۾ تيار ڪيل تئل جي برابر پلاسٽڪ جون ننڍيون ٿيلهون (4×6 س.م) ٻيجاري جي تياري جي لاءِ مناسب آهن. ٿيلهين جي پاسن ۾ اضافي پاڻي جي نيڪال جي لاءِ ننڍا ننڍا سوراخ ڪري ڇڏيو. هاڻي ٿيلهين کي مٽي ۽ وٽاڻ جي پاڻي کي برابر مقدار ۾ پري ڇڏيو. هر ٿيلهي ۾ هڪ ٻج لڳائي تئل جي اندر رکيو ۽ ان جي مٿان پاڻي ڏيو. انهي طريقي سان ڪريلا ڊسمبر ۾، جڏهن ته ڪڍو، گدرو، چانهين، ميه، چيني ڪڍو، ڪاري توري، جنوري جي آخر ۾ لڳايو. فيبروري تائين جڏهن پارو ڪرڻ بند ٿي وڃي ۽ شديد سردي ختم ٿئي ته باغيچي ۾ ٻيجارو منتقل ڪري پاڻي ڏئي ڇڏيو. ٻيجاري جي منتقلي جي وقت ٿيلهين کي پاڻي ڏئي ايتو ڪرڻ سان ٻوٽا مٽي(چڪي) سميت منتقل ٿي سگهن ٿا. انهي طريقي سان ٻوٽن جي مرڻ جو خطرو نٿو رهي. ٿيلهيون سنڀالي رکڻ سان وري وري استعمال ڪري سگهجن ٿيون. انهي طريقي سان آڳاٽي پاڇي ٿيندي، انهي طريقي سان پيداوار ۾ عام فصل جي مقابلي ۾ ٻيڻو اضافو ممڪن آهي.

ڪونڊين ۾ پاڇين جي پوک

وڏن شهرن ۾ گهريلو بيماني تي پاڇين جي پوک جي لاءِ جاءِ جو نه هجڻ هڪ اهم مسئلو آهي. ڪونڊين، ڪاٺ جي ڪوکن، ٻورين، ڊالبا جي دٻن، پلاسٽڪ جي برئين ۽ خالي ٿانون وغيره کي پاڇين جي پوک جي لاءِ استعمال ۾ آڻي سگهجي ٿو. پاڇين جي جسامت ۽ پکيڙ موجب ڪونڊيون حاصل ڪيون وڃن مثال طور ڪڍو جي لاءِ وڏين ڪونڊين جو استعمال ٿيندو، اهڙي طرح سان پالڪ، ڌاڻي جي پوک جي لاءِ ڪونڊين جي اوچائي اگر گهٽ به هجي پر پوکي جي ايراضي وڌيڪ هئڻ گهرجي يعني ٻارين جهڙن ڪونڊين جو استعمال ان لاءِ مناسب آهي. پاڇيون پوکڻ جي لاءِ ڪونڊين جي هيٺيان پاڻي جي نيڪالي جو موزون انتظام هئڻ گهرجي، ڪونڊين کي ڪمپوسٽ يا مٽي، پاڻي ۽ واري کي برابر حصن ۾ ورهائي ڀرڻ

سان ٻوٽا لڳائي سگهجن ٿا، مناسب وقفي سان پاڻي ڏيڻ گهرجي. ڪونڊيون درين تي، لان ۾ يا ڇت تي اهڙي جاءِ تي رکي سگهجن ٿيون، جتي ڏينهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ 6 ڪلاڪ سج جي روشني ٻوٽن تائين پهچندي هجي.

پاڇين لڳائڻ کان پهرين هيٺ ڏنل اهم ڳالهين تي ڌيان ڏيڻ ضروري آهي.

- باغيچي جي لاءِ هميشه وٽاڻ جي گريل سٽريل پاڻ جو استعمال ڪريو، تازي ۽ ڪچي پاڻ کان پرهيڙ ڪريو.
- زمين جي چڱي طرح گڏ ڪري، ان کي نرم، ڀرپور ۽ هموار ڪري ڇڏيو.
- پوکي کان پهرين گڏ ڪري زمين کي روشني ۽ هوا لڳڻ ڏيو، ٻن ڏينهن کانپوءِ گڏ ڪري مٿاڇرو سنوٽ ۾ آڻيو.
- پاڇيون هميشه قطارن ۾ (قطارن ۽ ٻوٽن جو سفارش ڪيل فاصلي جي مطابق) پوکيون وڃن.
- ولين وارين پاڇين کي ڪناري جي ويجهو لڳائي سهارو ڏجي ته جيئن گهٽ جاءِ کي وڌيڪ بهتر انداز ۾ استعمال ڪري سگهجي.
- گجر جي لاءِ لتياسي نرم ۽ وارياسي زمين جي ضرورت ٿئي ٿي ته جيئن ان جون پاڙون مناسب واڌ ويجهه ڪري سگهن.
- بصر ۽ گل گوٺي جي لاءِ سفارش ڪيل ٻج پوکيا وڃن ته جيئن گهٽ جاءِ کي وڌيڪ بهتر انداز ۾ استعمال ڪري سگهجي.
- بصر جي لاءِ ڦلڪارا جنس تقريبا هر موسم ۾ پوکي سگهجي ٿي.
- پاڻ سفارش ڪيل مقدار کان وڌيڪ استعمال نه ڪجي.
- مرچ هميشه ڪرين تي پوکجي ته جيئن بيمارين جي خطرن کي گهٽ ڪيو وڃي.
- لاهوري گجر جي لاءِ وٽاڻ جو پاڻ استعمال نه ڪجي.
- مناسب وقفن سان پاڻي ڏيڻ گهرجي.
- باغيچو ۽ آسپاس وارو علائقو گند ڪا به کان پاڪ رکجي.
- جيتن ۽ بيمارين جي لاءِ قوھاري ڪرڻ کان پهرين زرعي ماهرن کان صلاح وٺڻ گهرجي.
- ڪڪڙن، ٻڪرين جي قرن ۽ ٻارن کان بچاءُ جي لاءِ روڪ ٿام ڪئي وڃي ته جيئن لڳايل پاڇين جي امڪاني نقصان کان بچي سگهجي.



وونئڻ، مرچ ۽ بصر جي فصل تي غذائي جزن جو قوهارو

حسن شاھ راشدي

زرعي تحقيق سنڌ، ٽنڊوڄام

hassanrashid@gmail.com

اڄ اوهان کي ڪجهه اهڙيون ترڪيبون ٻڌايون ٿا جيڪي اوهان جي فصلن جهڙوڪ وونئڻ، مرچ ۽ بصر جي فصل لاءِ نهايت فائدي واريون ثابت ٿينديون. جيئن ته اوهان اهيو ڄاڻو ٿا ته فصلن جي ٻوٽن کي هوا، پاڻي ۽ روشني سان گڏ غذائي جزن جي به ضرورت هوندي آهي جنهن ۾ اهم خوراڪي جزن سان گڏو گڏ خورد خوراڪي جزا به شامل آهن.

عام طرح سان جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته زمين اندر پي ايڇ وڌيڪ هئڻ ڪري ٻوٽو خوراڪي جزا نٿو کڻي سگهي، ڇو ته اهي جزا زمين اندر هيٺ هليا وڃن ٿا ۽ ٻوٽو پنهنجي واڌ کي روڪي گل ٻاڻي ۽ ميوو جهڻڻ شروع ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح پيداوار ۾ گهٽتائي اچي وڃي. ٻوٽا پنهنجي خوراڪ بن طريقن سان کڻن ٿا، هڪ پاڙ وسيلي ۽ ٻيو پنن جي مدد سان، جيڪڏهن زمين اندر مسئلو هجي ته ٻوٽا زمين مان ٺيڪ طرح سان خوراڪ نٿا کڻن ۽ ڪمزور ٿي ڪري گهٽ پيداوار ڏين ٿا.

جيڪڏهن انهن ٻوٽن کي خوراڪ پنن وسيلي ڏجي ته فصلن مان وڌيڪ پيداوار حاصل ڪري سگهجي ٿي. جهڙوڪ مٽي ذڪر ڪيل فصلن جي پنن تي خوراڪي جزن جي قوھاري سان بهتر نتيجا سامهون ايندا. هاڻ سوال اهو ٿو اڀري ته هڪ آبادگار کي زمين ۾ پاڻ وجهڻ سان مالي نقصان ٿي رهيو آهي، ته پوءِ آبادگار کي انهي نقصان کان بچائڻ لاءِ ڪيئن ڦاٿل ڪجي، ته اهو مسئلو به هاڻ حل ٿي چڪو آهي. جتي اسان ٻورين جي حساب سان پاڻ زمين ۾ وجهون ٿا، ان جاءِ تي اهم خوراڪي جزا قوھاري وسيلي ڪلوگرامن ۾، جڏهن ته خوراڪي جزا گرامن ۾ استعمال

ڪندا سين ته اسان جي خرچ ۾ گهٽتائي اچي ويندي ۽ فائدو وڌيڪ ٻوندو، ڪجهه غذائي جزا اهڙا آهن، جيڪي مارڪيٽ ۾ تمام سستا ملن ٿا جن جي اسان کي خبر ئي ڪانهي، جهڙوڪ قلمي شورو ۽ لوڻ (ميگنيشم سلفيٽ) جنهن کي ايپسم سالت يا جلاب وارو لوڻ چيو وڃي ٿو، پوٽاشم نائٽريٽ ۽ ميگنيشم سلفيٽ جيڪي ڪنهن ڪمپني کان نه پر عام مارڪيٽ مان پاساري جي دوڪان تان سستا ملندا. قلمي شوري ۾ پوٽاشم ۽ نائٽريٽ جڏهن ته لوڻ (ميگنيشم سلفيٽ) ۾ موجود ميگنيشم ۽ سلفر ٻوٽن جي واڌ ويجهه ۽ بيماري خلاف قوت مدافعت ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. هاڻ پاڻ انهن جزن جي قوھاري بابت ترڪيب بيان ڪنداسين، جيڪا مختلف فصلن تي استعمال ڪبي.

وونئڻ: وونئڻن ۾ عام طرح سان رس چوسڻ وارن جيتن جي ڪري مختلف قسمن جون نشانيون ڏٺيون وڃن ٿيون جنهن مان هڪ کي ڳاڙھ پني چئجي ٿو، ان لاءِ تحقيق مان خبر پئي آهي ته رس چوسڻ وارن جيتن جي حملي هئڻ ڪري پنن اندر خورد خوراڪي جز ميگنيشم جي ڪوت ٿيو وڃي جنهن ڪري پن ڳاڙها ٿيو وڃن.

آخريڪار پورو ٻوٽو بيمار ٿيو پوي. ان لاءِ قلمي شورو (پوٽاشيم نائٽريٽ) هڪ ڪلوگرام ۽ لوڻ هڪ ڪلو (ميگنيشم سلفيٽ) 100 ليٽر پاڻي ۾ ڳاري وونئڻن جي هڪ ايڪڙ تي ٻه قوھارا ڪجن ۽ هر قوھاري وچ ۾ ٻن هفتن جو وقفو هجي.

مرچ ۽ بصر جي فصل ۾ سلفر ۽ پوٽاش جي وڌيڪ ضرورت پوي ٿي ۽ جيڪڏهن ٻوٽن کي انهن جزن جي بهتر فراهمي نٿي ته اهي مختلف بيمارين جو شڪار ٿي وڃن ٿا. ان لاءِ هڪ ڪلوگرام قلمي شورو (پوٽاشيم نائٽريٽ) ۽ 250 گرام لوڻ (ميگنيشم سلفيٽ) 100 ليٽر پاڻي ۾ ڳاري ٻوٽن تي قوھارو ڪريو ۽ ٻيو قوھارو 20 ڏيهن جي وقفي سان ڪريو. ائين ڪرڻ سان فصل صحت مند رهندا، جنهن جي نتيجي ۾ فصلن مان وڌيڪ پيداوار ملندي.

ڪريل جي پوک

ڊاڪٽر بينا خانزادا

سينيئر سائنٽسٽ

ايگريڪلچر ريسرچ سينٽر ٽنڊوڄام

آڪاش پنهور

ڊپارٽمينٽ آف پلانٽ پروٽيڪشن

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊوڄام

Pahnwarakash5@gmail.com

ڪريلا Bitter Gourd

زمين جي چونڊ: ڪريل جي پوکي لاءِ اهڙي زمين جي چونڊ ڪجي جنهن ۾ پاڻي جي نيڪال جي خاصيت موجود هجي زرخيز چيڪي لتاسي ٻين جي پيٽ م بهتر ڀلي زمين آهي ۽ وڌيڪ پٽڊاوار ڏيڻ جي سگهه رکي ٿي

زمين جي تياري: ڪريل جي پوکي لاءِ چونڊيل زمين کي مهينو اڳ زمين م ڳريل سڙيل وڻاڻ جي پاڻ جون 20 کان 25 گاڏيون في ايڪڙ وجهي ديسي هر وسيلي ملائڻ گهرجي جنهن کان پوءِ ٻه ٽي هر ڏئي پتر پوري زمين کي هموار ڪجي

ٻج جو مقدار:

ڪريل جي پوکي لاءِ ٻج 4 کان ساڍا 4 ڪلو گرام في ايڪڙ استعمال ڪجي ٻج جي چونڊ ۽ کوالتي جو اهم معيار آهي جنهن سان سٺي پٽڊاوار ملي ٿي ان لاءِ صحت مند ۽ بيمارين کان پاڪ ٻج جي چونڊ ڪرڻ گهرجي

پوکي جو وقت:

ڪريل جو فصل سال ۾ ٻه ڀيرا پوکيو وڃي ٿو جن مان پهريون فصل فيبروري مارچ م ۽ ٻيو جون جولاءِ م پوکيو وڃي ٿو ڏکڻ سنڌ م ڪريل جو فصل فيبروري جي پهرين هفتي م ۽ اتر سنڌ م 15 فيبروري کان پوءِ پوکجي ٿو باقي منڊاڻو فصل جون جولاءِ م پوکجي ٿو.

پوکي جو طريقو: پوکي کان اڳ جڏهن ڪريا ٺاهجن ته انهن ۾ DAP يا NPK پاڻ جي هڪ ٻوري وجهي ڪريا 5 کان 6 فوٽ ويڪرا ٺاهجن

جن جي ٻنهي پاسن کان 6 انچن جي مفاصلي تي چنگيون هڻجن هر چنگي م ٻن کان ٽي ٻج جا ڌاڻا وجهڻ گهرجن جيڪي زمين م هڪ انچ کان ڏيڍ انچ اونهاجن پوکي کان اڳ ۾ ٻج کي 5-6 ڪلاڪ پاڻي م پسائي رکجي ت جيئن ٻج جو ڦوٽهڙو تڪڙو ٿئي ٿو

ڪيميائي پاڻ جو استعمال

DAP يا NPK هڪ ٻوري پوکي وقت باقي گل ٻاڻي تي پهچي ته يوريا جي هڪ ٻوري في ايڪڙ تي ڏيڻ گهرجي

گند گاه

فصل م غير ضروري گند گاه جي خاتمي لاءِ گڏ ڪيڏن گهرجي جنهن سان زمين نرم رهندي ۽ جيتن بيمارين جو حملو گهٽو نه ٿيندو

پاڻي

ڪريل جي فصل کي هر هفتي پاڻي ڏيڻ گهرجي يا وري گهرج مطابق پاڻي ڏيڻ گهرجي

جيت

1 ميو جي مڪ Fruit Fly

ڊپٽريڪس ML 400 يا ٽراءِ ڪلوروفون 68080 SP گرام في ايڪڙ

2 جون Mite

اوبيران ML 100 يا پائريڊين 200 سي سي يا پولو ML 200 في ايڪڙ

3 گاڙهي ٽنڊ ٽي

ڪراٽي 60 سي سي يا اڪٽارا 24 گرام يا اميدا 60 سي سي في ايڪڙ

4 آمريڪن ڪينٽون، لشڪري ڪينٽون، چٽڪرو ڪينٽون

اسٽورڊ 75 يا ٽريسر 40 سي سي يا ايماميڪٽن ML 200 في ايڪڙ

پٽڊاوار

ڪريل جي فصل تي سٺي محنت ڪيل فصل مان ايڪڙ تي 100 کان 150 مٺ تائين پٽڊاوار حاصل ڪري سگهجي ٿي مارڪيٽ ۾ اڪثر ڪري پڪل ڪريلا گهٽ اگه ڪندا آهن ۽ ان جو وڪرو به گهٽ ٿيندو آهي هميشه ڪچا ڪريلا پٽي موڪلجن ۽ چونڊو به هر ٻئي ڏينهن ڪجي



ميون جي نرسري تيار ڪرڻ جي حڪمت عملي

ميمونہ اسلام

ڊپارٽمينٽ آف هارٽيڪلچر،

سنڌ زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

اهي ميوا جنهن ۾ لڳ وارو عمل ڪليل گلن (Cross pollination) ۾ ٿئي ٿو انهن ميون جي تيار ٿيل چڪين جي ٻوٽن جو ميوو پنهنجي خاندان جهڙو منو، سواد ۽ خوشبو وارو نٿو ٿئي جهڙوڪ: انب، چيڪو، ٻير، ليما وغيره. انهن ميون جي نرسري ڪجهه مهينن ۾ تيار ٿي وڃي ٿي، جڏهن مادري ٻوٽي (Rootstock) جي ڪاٺي پينسل يا اڳر جي ٽولم برابر ٿي وڃي ٿي ته پوءِ انهي تي پيوند ڪاٺي (Scion) جو گرافٽ يا اک (چشمو) لڳائي وڃي ٿي.

وڻ پنهنجي مزاج، موسم ۽ عمر جي لحاظ کان هڪ سال کان پنجن سالن تائين ميوو جهلين ٿا. مثال طور: پيٽو ۽ ڪيلو هڪ سال کانپوءِ، ٻير ۽ ليمو ٽن سالن کانپوءِ، انب ۽ چيڪو چار سالن کانپوءِ ۽ ڪجور پنجن سالن کانپوءِ ميوو جهلي ٿي.

نرسري لڳائڻ کان پهرين ڪجهه ڳالهين جو ڌيان رکڻ گهرجي.

- ٻوٽي لاءِ هميشه صحيح پيوندي ڪاٺي جي چونڊ ڪرڻ گهرجي ته جيئن اک (Bud) جو ميلاپ (Union) ٿي سگهي پر انهي ڳالهه جو خيال رکجي ته روت اسٽاڪ طور استعمال ٿيندڙ ٻوٽو صحت مند، سگهارو ۽ انهي جون پاڙون هيٺ پڪڙڻ سان گڏوگڏ هيٺ زمين اندر اونهيون وڃن ته جيئن اڳتي هلي

پيوند ٿيل وڻ سگهارو ٿئي ۽ موسمي حالتن کي برداشت ڪري سگهي ۽ زمين مان وڌ ۾ وڌ خوراڪ حاصل ڪندو رهي.

- ٻوٽن کي پلاسٽڪ جي ٿيلين اندر گهڙي عرصي تائين نه رکڻ گهرجي جنهن سان پاڙن جي واڌ هٽ ڪري اهي ٿيلمي کان ٻاهر نڪرڻ شروع ڪن ٿيون ۽ پوءِ ٻوٽي جي مرڻ جا خدشا گهڻا ٿا سگهن ٿا تنهن ڪري ٻوٽي کي وقت تي زمين اندر منتقل ڪرڻ گهرجي.

ٻج جي چونڊ:

ميون جي نرسري لڳائڻ لاءِ هميشه تازي ٻج جي چونڊ ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ ڦوٽهڙي جي صلاحيت وڌيڪ هوندي آهي.

زمين جي چونڊ ۽ تياري:

نرسري لاءِ زمين جي چونڊ هميشه اهڙي جاءِ تي ڪجي جتي پاڻي جي سهولت موجود هجي ۽ پڻ ٻوٽن لاءِ هلڪي چانوءَ هٽڻ ضروري آهي. نرسري کي فيڪٽرين ۽ ڪارخانن جي ڀرپاسي ۾ يا روڊ جي گڏوگڏ نه لڳائڻ گهرجي جنهن سان مٽي ۽ دونهون ٻوٽن کي نقصان ڏئي سگهن ٿا ۽ پڻ زمين هميشه مٿانهين جاءِ تي هٽڻ ضروري آهي.

زمين جي تياري لاءِ سڀ کان پهرين زمين کي اونها هر ڏئي، پٽريجي، هموار ڪري، ننڍيون ننڍيون ٻوٽن جي مناسبت سان ٻاريون ٺاهي ۽ ٻن ٻارين جي وچ ۾، پاڻي لاءِ نالي ٺاهجي. نرسري لاءِ تيار ڪيل زمين ۾ ڇهه سَو مٽ وٿاڻ جو پاڻ جيڪو گريل سٽيل هجي جيڪو في ايڪڙ جي حساب سان پڪيڙي، ڪوڏر سان دڙ ڪري، زمين ۾ ملائجي. جيڪڏهن زمين سخت هجي ته ڪجهه حصو واري جو ملائجي. پوءِ ٻارين کي هڪ ٻه پاڻي ڏجن، ته جيئن پاڻ واري گرمي ختم ٿي وڃي.

جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته ٻارين ۾ دڙ ڪري، کين سنوت ۾ آڻجي، تنهن کانپوءِ گهريل جنس جا ٻج مقرر ڪيل فاصلي تي قطار ۾ لڳايا وڃن. جيڪڏهن اهي ٻج ٿيلهي ۾ لڳائڻا هجن ته پوءِ ٿيلهي اندر ناريل جي چلڪن جو چورو (coco peat) 5 کان 10 سيڪڙو، بگاس (Bagas) 60 کان 65 سيڪڙو ۽ باقي حصي ۾ واهن يا شاخن جي لت يا واري (canal silt) کي ملائي پريو وڃي جنهن سان سنا نتيجا حاصل ٿين ٿا، جڏهن ته ٿيلهي جي جسامت کي ٻوٽي جي جنس موجب رکيو وڃي.

پيوندڪاري لاءِ جنس جي چونڊ :

- ٻوٽن اندر پيوندڪاري لاءِ چونڊيل جنس اندر اهي خاصيتون هئڻ گهرجن،
- جنس جي مخصوص سڃاڻپ هئڻ گهرجي.
- جنس هميشه سٺي پيداوار ۽ اعليٰ ميوو ڏيندڙ هجي.
- جنس تجارتي طور منظور شده هجڻ گهرجي.
- ڪنهن به قسم جي بيمارين ۽ جيتن جي حملي کان پاڪ هئڻ گهرجي.

پيوندڪاري جو وقت :

جڏهن نرسري اندر ٻوٽن جي سٺي سار سنڀال ڪئي وڃي ۽ وقت تي پاڻي ۽ گڏ دڙ وغيره ڪجي ته پوءِ ٽن مهينن کانپوءِ ويهه کان پنجهويهه سيڪڙو ٻوٽا پيوندڪاري جي لائق ٿي وڃن ٿا ۽ باقي رهيل ٻوٽا ايندڙ بهار ۾ يعني فيبروري مارچ ۾ پيوند ڪرڻ جي لائق ٿي وڃن ٿا. انهن پيوند ڪيل ٻوٽن جون چڪيون جولاءِ آگسٽ ۾ ڪيڊ جي لائق ٿيو وڃن ۽ باقي رهجي ويل ڪجهه پيوند ڪيل ٻوٽا، ايندڙ بهار ۾ لڳائڻ جي قابل ٿيو وڃن.

پيوندڪاري جو طريقو :

پيوندڪاري لاءِ چونڊيل جنس مان جيڪي ٽاريون پيوندڪاري لاءِ استعمال ڪرڻيون هجن، اهي چار کان پنج مهينا پراڻيون هجن ۽ اهي ٽڪرا 6 کان 8 انچ ڊگها هجن ۽ انهن جي ٽولهه، پينسل جهڙي هجي يا وري روت اسٽاڪ جي ڪاٺي برابر هجي. پيوندي ڪاٺي (سائڻ) ۾ ٽي کان چار اڪيون هئڻ گهرجن.

ٻوٽن ۾ پيوند ڪرڻ واري جاءِ زمين کان ايتري مٿي هجي جو پاڻي جي سطح ان تائين نه پهچي. روت اسٽاڪ جي ڪاٺي تي پيوندي چاقو جي مدد سان ڏيڍ کان ٻه انچ ڊگهو ڪٽ ڏئي ۽ ڪل لاهي ۽ اوتروئي ڊگهو ۽ پاسيرو وڌ پيوندي ڪاٺي (سائڻ) تي ڏجي ۽ پوءِ پيوندي ڪاٺي کي روت اسٽاڪ واري ڪاٺي تي ٻنهي وڏن کي پاڻ ۾ چڱي طرح ملائي پلاسٽڪ جي پٽي سان ٻڌي قابو ڪري ٻڌجي.

جيڪڏهن موسم سٺي هوندي ته پوءِ 15 کان 20 ڏينهن جي عرصي ۾ پيوند ڪيل ٽڪرن جون چوٽي واريون اڪيون (ٻڌ) ڦٽڻ شروع ڪنديون ۽ پوءِ جڏهن قلم ڦٽي وڃي ته روت اسٽاڪ کي پيوند واري جاءِ کان 2 کان 3 انچ مٿي ڪپيو وڃي ۽ روت اسٽاڪ تي سواءِ پيوندي ڪاٺي (سائڻ) کانسواءِ ٻيون ڦٽندڙ ٽارين کي آهستي آهستي ڪڍي ڇڏجي ته جيئن گهريل جنس جا ٻوٽا تيار ٿي سگهن ۽ جڏهن چڪيون تيار ٿي وڃن ته پوءِ انهن کي باغ ڏانهن منتقل ڪجي.



ميون جي وڻڪاري ۽ نوجوانن لاءِ روزگار

مصطفيٰ نانگراج

سند ۾ هر سال وڻڪاري مهم دوران لکين وڻ لڳايا وڃن ٿا، جن ۾ روڊن رستن جا ٻئي پاسا به شامل هجن ٿا. جيترو سالن کان هيءَ وڻڪاريءَ جي مهم هلائي پئي وڃي اُن مطابق ته هاڻ رستن جي پاسن کان وڻ لڳائڻ جي جڳهه نه هجڻ گهرجي. پر ان جي باوجود هن وقت به جنهن به رستي سان نڪرجي ٿو اُتي وڻن جي شديد کوٽ آهي. جنهن جو سڀ کان اهم سبب هي آهي ته جنهن طريقي سان وڻن کي لڳائڻ گهرجي، ائين وڻ نٿا لڳايا وڃن، جنهنجي ڪري چڪيون هڻڻ کان پوءِ هڪدم ئي مري وڃن ٿيون ۽ ان سان گڏ وڻن جي بعد ۾ سارسنڀال به صحيح طرح سان نٿي ڪئي وڃي. جيئن ته سنڌ جون زمينون ايتريون گهڻيون زرخيز ناهن. ڪلر ۽ سم جا به ڪٿي ڪٿي مسئلا آهن. اُن سان گڏ رستن جي آس پاس ته پٿر وغيره به هجن ٿا، ان ڪري وڻڪاري لاءِ سائنسي پوکي جو طريقو اپنائڻ گهرجي.

اُن لاءِ ضروري هجي ٿو ته ڪوبه وڻ لڳائڻ کان پهرين وڻ لڳائڻ واري جڳهه تي اڍائي کان 3 فوٽ اونجهون ۽ اڍائي کان 3 فوٽ همچورس ويڪرو ڪڍو هڻي، ڪڏي مان نڪتل مٽيءَ کي آس پاس پڪيڙي ڇڏجي ۽ کوٽيل ڪڏن کي هڪ هفتي لاءِ کليل ڇڏي ڏجي. هفتي بعد ڪڏن ۾ شاخ جو ڪٽ ۽ وٿاڻ جو پراڻو پاڻ هموزن ملائي ڪڏن کي پري مٿان پاڻي ڏجي. جيڪڏهن لُٽ نه ملي ته پوءِ صاف پوکيءَ وارن زمينن جي مٽي، واري ۽ وٿاڻ جو پاڻ هموزن ملائي ڪڏن کي پري پاڻي ڏجي ۽ 15 ڏينهن کان پوءِ اُنهن ڪڏن ۾ وڻڪاري ڪرڻ گهرجي. ان طريقي سان ڪيل وڻڪاري واريون چڪيون مرنديون نه ۽ جلديءَ ۾ تيار به ٿي وينديون. ان سان گڏ ٻار ٻار وڻ پوکڻ تي ٿيندڙ خرچ کان به بچي سگهيو. ڏٺو اهو ويو آهي ته وڻڪاري مهم دوران گهڻو زور وڻ پوکڻ جي تعداد تي آهي پر انهن مان ڪيترا وڻ بحال ٿيندا؟ ان طرف ڌيان نٿو ڏنو وڃي تنهن ڪري وڻڪاري مهم تي زور ڏيڻ باوجود گهڻي ڪاميابي نصيب نٿي ٿئي. ان ڪري وڻ هميشه سائنسي طريقي سان پوکجن ته جيئن ڪاميابي يقيني ٿي سگهي.

جيئن ته سنڌ ۾ غربت، بيروزگاري ۽ خوراڪ جي ڪمي اڪثر آباديءَ جا اهم مسئلا آهن. جن جي حل لاءِ رستن جي پاسن سان ميووي جا وڻ پوکي ڪافي ڪجهه فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو. ميووي جي

وڻ جي وڻڪاري ڪرڻ سان نه صرف آبهوا بهتر ٿيندي ۽ گدلاڻ گهٽبي پر ساڳئي وقت ان مان اضافي فائدي طور ميوو حاصل ٿيندو. جيڪو غريب غريبي کي آسانيءَ سان سستو ملي سگهندو. اهڙن وڻن ۾ ديسي انب، ڄمون، چيڪو، ڪڇي، ناريل، گيدوڙيون، ليار، ٻيريون، توت وغيره پوکي سگهجن ٿا. جن کي سرڪاري ۽ نجی شعبي جي سهڪار سان جهڙي ريت روڊ جوڙيا ويا آهن اهڙي ريت ميوون جي وڻڪاري ڪري سگهجي ٿي.

پوکيءَ کان پوءِ اُنهن علائقن جي پڙهيل لکيل بيروزگار خاص طور تي زرعي گريجوئيٽس کي ڪٿي اڳيان آڻجي. هر هڪ نوجوان کي هڪ ڪلوميٽر جا ٻئي پاسا ٺيڪي ۾ ڏجن. شروعات ۾ هر نوجوان کي هڪ موٽر سائيڪل واري آٽولڊر ۾ پاڻيءَ جي ٽينڪ لڳرائي ڏجي ۽ مهيني تي سارسنڀال ۽ وڻن کي پاڻي ڏيڻ جو خرچ ڏجي ۽ ٽن چئن سالن ۾ جڏهن وڻ ميوو ڏيڻ شروع ڪن ته اُن جو اڌ منافعو ڪمپني ڪٿي ۽ اڌ منافعو ان گريجوئيٽ کي ڏنو وڃي. اهو ڪانٽريڪٽ جو مدو 10 کان 15 سال تي سگهي ٿو.

هڪ ڪاٿي موجب اسان جي سنڌ جي هڪ رستن جهڙوڪ، حيدرآباد کان گهوٽڪي ۽ شڪارپور، حيدرآباد کان لاڙڪاڻو، حيدرآباد کان مٺي، حيدرآباد کان بدين ۽ مٺي، حيدرآباد کان سجاول ۽ حيدرآباد کان ڪراچيءَ جو ڪل مفاصلو 1,803 ڪلوميٽر آهي. جنهن جي ٻنهي پاسن سان 15 فوٽن جي مفاصلي تي ميووي وارا وڻ پوکڻ سان ڪل 188,646 وڻ لڳندا. اهڙي طرح سان هنن رستن جي ڪنارن سان پوکيل ميووي جي وڻن جي سارسنڀال لاءِ نوجوانن جو ڪل انگ 1,803 پيهندو. جيڪي نوجوان سڌي ريت روزگار سان لڳندا پر ان سان گڏ ڪيترن ئي مزدورن کي مزدوري ملندي. اهڙن وڻن جي ڀرسان انگورن جون وليون پوکي اُهي نوجوان اُنهن مان اضافي ميوو حاصل ڪري سگهن ٿا.

هن سوچ کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ شروعات ۾ ننڍي پيماني تي ڪنهن هڪ روڊ تي شروعات ڪجي بعد ۾ هر سال ان کي وڌائي ۽ اڳيان نڍين روڊن تي به ڪئي وڃي سگهجي ٿو. اهڙي طرح روڊن جي اڳيان پيل زمين کي به استعمال ڪرڻ لاءِ ميوون جي نرسرين جي به ابتدا ڪري سگهجي ٿي. اهي ساڳيا نوجوان پنهنجي ايراضيءَ ۾ ميوون، ڀاڄين، گلن، ٻوٽن جون نرسريون لڳائي ڪمائي ڪرڻ سان گڏ صوبي ۾ معياري چڪين جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي سگهن ٿا.



گلن جي نرسري تيار ڪرڻ جي حڪمت عملي

ميمونہ اسلام ۽ سراج الدين مجيد اڻو

گلن جي نرسري تيار ڪرڻ جا هي مختلف نباتاتي ۽ بچ ذريعي طريقا زرعي سائنس جي ترقيءَ جو عڪس آهن، جيڪي نرسري جي ڪارڪردگي، معيار، ۽ واڌويجهه جي شرح کي وڌائڻ لاءِ اختيار ڪيا وڃن ٿا. هر ٻوٽي جي واڌ لاءِ هڪ مخصوص طريقو وڌيڪ موزون هوندو آهي، جنهن سان وقت، وسيلن، ۽ جڳهه جي بچت ٿئي ٿي. جديد باغبانيءَ ۾ انهن طريقن جي اهميت ان ڪري به آهي جو هي طريقا تجارتري نرسرين جي پيداواري صلاحيت وڌائين ٿا، بيماري کان پاڪ، هڪجهڙن خاصيتن وارا ٻوٽا مهيا ڪن ٿا، ۽ بدلجندڙ موسمي حالتن سان مطابقت رکندڙ ٻوٽا تيار ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا.

ان کانسواءِ، مقامي مارڪيٽن ۾ هڪ جهڙو فائدو حاصل ڪرڻ، زينتي ٻوٽن جي طلب کي پورو ڪرڻ، ۽ شهري ۽ بهراڙي جي علائقن ۾ سائي ماحول جي واڌ لاءِ پڻ هي طريقا انتهائي ضروري ٿي پيا آهن. تنهن ڪري، گلن جي نرسري جي سائنسي بنيادن تي تياري نه صرف ماحولياتي حسن کي وڌائي ٿي، پر هڪ پائيدار زرعي معيشت لاءِ به نئون رستو کولي ٿي. گلن جي نرسري تيار ڪرڻ لاءِ ٻه طريقا استعمال ۾ آڻجن ٿا، جنهن ۾ پهريون طريقو بچ وسيلي ۽ ٻيو طريقو نباتاتي حصن ذريعي جهڙوڪ: قلم وغيره جو استعمال ڪيو وڃي ٿو.

1. **بچ وسيلي:** گلن جي نرسري تيار ڪرڻ جو سڀ کان عام ۽ قدرتي طريقو بچ وسيلي آهي. هي طريقو انهن گلن لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جن جا بچ سولائيءَ سان ڀوڪيا ۽ وڌايا وڃن ٿا. گل دائودي (Chrysanthemum)، گيندو (Marigold)، زينيا (Zinnia)، پيتونيا (Petunia)، سالويہ (Salvia)، ايسٽر (Aster)، ۽ پينسي (Pansy) وغيره بچ وسيلي ڀوڪيا وڃن ٿا. انهي طريقي سان وڏي مقدار ۾ هڪ ئي وقت گلن جا ٻوٽا پيدا ڪري سگهجن ٿا ۽ سڀئي ٻوٽا مادري ٻوٽي وانگر هڪجهڙا ٿين ٿا. واڌ جي رفتار نسبتاً سست هوندي آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن بچ ڀوڪڻ کان پوءِ گل اڇڻ تائين گهڻو وقت لڳندو آهي. گلن کي پڻ ٻين ڪيترن ئي طريقن سان پڻ ڀوڪيو وڃي ٿو.

2.

نباتاتي حصن وسيلي: اهي ٻوٽا جنهن اندر بچ نٿو ٺهي يا وري بچ نه ٿي ٿو پر انهي اندر ڦوٽڙو نٿو ٿئي ته انهن ٻوٽن کي نباتاتي حصن ذريعي وڌايو وڃي ٿو. نباتاتي حصن يعني قلم ذريعي ٻوٽا لڳائڻ سان وراثتي بيمارين کان پڻ بچاءُ ٿئي ٿو. نباتاتي حصن جهڙوڪ: قلم (cutting)، داب يا واڌ (layering)، بچا (sucker)، ڀيوندڪاري (Grafting) ۽ گنڊ (Corms) جو استعمال ڪجي ٿو.

قلم ذريعي: ٻوٽي جي ٽارين، پاڙ ۽ پنن کي قلم طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. اهي ٻوٽا جنهن به مادري ٻوٽي مان قلم طور ورتا ويا هجن اهي لڳايل ٻوٽا ساڳي شڪل شباهه جا ٿين ٿا. قلمن جا مختلف قسم ٿين ٿا.

ٽارين مان ورتل قلم: ٻوٽي جي انهن ٽارين کي قلم طور استعمال ڪيو وڃي ٿو جنهن ۾ ٻه يا ٽي اڪيون (چشما) موجود هجن.

سخت ٽارين جا قلم: اهي قلم ان وقت ورتا وڃن ٿا، جڏهن ٻوٽي تي ڪنهن به قسم جي واڌويجهه وارو عمل نه ٿيندو هجي ۽ ٻوٽو سٽل حالت (Dormant) ۾ هجي ۽ پراڻين ٽارين (Mature stem) کي قلم طور استعمال ڪجي ٿو. اهي قلم بهار اڇڻ کان پهرين يا وري نئين ٽارين اڇڻ کان پهرين سانوڻ جي موسم ۾ يا سياري جي آخر ۾ ورتا وڃن ٿا يا وري پوئين سال وارين ٽارين کي قلم طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. گلاب، چائنا روز، موتيه، چمبيلي، رات جي راڻي، دن ڪا راج، گل فانوس، گل چين کي انهن کي قلمن وسيلي لڳايو وڃي ٿو.

وچولين سخت ٽارين جا قلم: اهي قلم ويڪري پن وارن ٻوٽن ۽ وڻن مان ورتا وڃن ٿا جهڙوڪ: ڪيمبليا، پٽوسفورم، ابوڊيندرن، يونيمس ۽ هولي ۽ پڻ ميوي وارن وڻن ۾ زيتون ۽ ڪتي ميون کي انهي نيم سخت ٽارين جي قلمن مان وڌايو وڃي ٿو. اهي قلم گرمي جي موسم ۾ جڏهن نيعون ٽاريون بهار جي موسم ۾ ڦٽڻ کانپوءِ گرمي اڇڻ تائين ٿوريون سخت ٿي وڃن ان وقت ورتيون وڃن ٿيون. قلم ڪٽڻ وقت انهن جا مٿين حصي وارا پن ائين ئي ڇڏيا وڃن ٿا، پر جيڪڏهن پن وڌيڪ هجن ته انهن کي ڪتي ننڍو ڪيو وڃي ۽ قلم جو آخري ڇهڪ اک (Bud) جي هيٺيان ڏنو وڃي. اهي قلم صبح جي وقت ڪٽيا وڃن جڏهن گرمي جو درجو گهٽ هجي ۽ پوءِ انهن کي ڍڪي رکيو وڃي، جيسيتائين انهن کي لڳايو نه وڃي. انهن قلمن کي ٿڌي ۽ نرم زمين ۾ لڳايو وڃي يا وري پلاسٽڪ جي تيلمين ۾ پڻ لڳائي سگهجي ٿو.

نرم ٽارين جا قلم: سدا بهار (Evergreen) ۽ پن ڇهڙيندڙ (Deciduous) ٻوٽن کي تازين ٽارين جي قلمن سان لڳايو وڃي ٿو ۽

پڻ نمائشي ٻوٽا (Ornamental plants) ۽ رڪاوٽي ٻوٽن (Fencing plants) کي انهن نرم ٿارين جي قلمن سان وڌايو وڃي ٿو. اهي قلم ٻين قلمن جي نسبت سهنجائي سان ۽ تڪڙو پاڙ ڪڍين ٿيون ۽ انهن قلمن اندر ٻن رڪيا وڃن ٿا ۽ انهن کي خشڪ ٿيڻ کان بچايو وڃي ۽ اهڙي جڳهه تي رکيو وڃي جتي تيز اس نه هجي ۽ اهي قلم 2 کان 5 هفتن ۾ پاڙ ڪڍيو وڃن.

- **وڌيڪ نرم يا ساوا قلم:** اهي قلم وڌيڪ نرم ۽ رسدار ٻوٽن جهڙوڪ: جرمينيم، ڊهليا، گل داوءِ دي ۽ ڪارنیشن ۾ استعمال ڪجن ٿيون ۽ انهن قلمن جي مٿان ٻن ڇڏيا وڃن ٿا ۽ انهن قلمن کي وڌيڪ گهم جي ضرورت پوي ٿي.

- **پنن جون قلمون:** انهي طريقي اندر ٻن جي ڏاندي مان نوان ٻوٽا تيار ڪجن ٿا. پاڙ ۽ شاخون، ٻن جي ڏاندي مان نڪرن ٿيون. سينسيوريا (Sensiveria) کي انهي طريقي سان لڳايو وڃي ٿو. ٻن کي 10 کان 7.5 سينٽي ميٽر جي حصي ۾ ڪٽيو وڃي ٿو ۽ پوءِ ان جو ٽيون حصو زمين ۾ دٻايو وڃي ٿو جنهن مان ٻن جي هيٺين حصي مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو.

- **پاڙن وارا قلم:** اهي قلم سياري جي آخر ۾ يا وري بهار جي اچڻ کان پهرين ورتا وڃن ٿا جڏهن ٻوٽن ۾ نئين واڌ ويجهه نه ٿي هجي. قلمن جي مٿين حصي تي سڌو وڍ ڏجي جڏهن ته هيٺين حصي تي پاسيرو ڪٽ ڏجي. قلم لڳائڻ وقت انهي کي عمودي طور تي لڳائجي ۽ مٿيون حصو زمين جي برابر هٿل گهرجي.

a. **پيوندڪاري (Grafting):** پيوندڪاري گلن جي خاص قسم جي ٻوٽن لاءِ هڪ اهم واڌ ويجهه جو طريقو آهي، جيڪو عام طور تي انهن گلن لاءِ استعمال ٿيندو آهي جيڪي ٻج يا قلم ذريعي آساني سان پيدا نٿا ٿين. هي طريقو خاص طور گلاب، چمبيلي، رات جي راڻي، گل چين ۽ ٻين زينتي گلن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. پيوندڪاريءَ ۾ صحتمند جڙون رکندڙ ٻوٽي (rootstock) تي ڪنهن ٻي گلدار ٻوٽي جي پيوندي تاري (scion) لڳائي ويندي آهي. جيڪڏهن ٻنهي حصن جو قطر برابر هجي ته اهي آسانيءَ سان پاڻ ۾ جڙي هڪ مضبوط ٻوٽو بڻجي ويندا آهن. پيوند لڳائڻ کان پوءِ ان کي پوسل ۽ ڇانو ۾ مناسب گرمي پد تي سنڀالڻو پوندو آهي، جيئن نئون گلدار ٻوٽو تيزي سان وڌي سگهي.

b. **ٻچا (Suckers):** ڪڇ گلن جا ٻوٽا جهڙوڪ گل دائودي، ليلي، ڪٽنا ۽ ٻين سدا بهار گلن جا ٻچا پاڻمرادو پاڙن جي پراسن نڪرندا آهن. اهي ٻچا ڌار ڌار ڪري نئين ٿيلهي يا ڪوندين ۾ پوکي سگهجن ٿا. ٻچن

ذريعي گلن جي پوک جي خاصيت اها آهي ته: نئون ٻوٽو جلدي وڌي ٿو، مادري ٻوٽي جون وصفون ساڳيون رهن ٿيون، نرسرين ۾ وڏي تعداد ۾ گلن جا ٻوٽا تيار ڪري سگهون ٿا، ٻچي کي ڌار ڪرڻ وقت، ان جي پاڙن کي صحيح طريقي سان ڪٽڻ، ڇانو ۾ رکي پوکڻ ۽ پوسل برقرار رکڻ ضروري آهي.

c. **دآپ يا واڌ (Layering):** هي گلن جي نباتاتي واڌ جو اهڙو طريقو آهي، جنهن ۾ ٻوٽي جي ڪنهن تاريءَ کي جهڪائي زمين سان ملائي دٻائڻ سان، ان مان پاڙون نڪرڻ تائين رکيو ويندو آهي. پاڙ نڪرڻ کانپوءِ ان حصي کي ڪپي ڌار ڪري نئون ٻوٽو پوکي سگهجي ٿو. هي طريقو خاص ڪري انهن گلن لاءِ موزون آهي، جيڪي آسانيءَ سان قلمن يا ٻجن سان نٿا وڌن. هڪ تاري کي هيٺان جهڪائي زمين ۾ دٻائي، مٿان هلڪي مٽي وجهي، فقط تاري جو ڇيڙي وارو مٿيون حصو ٻاهر رهندو آهي. جيئن گلاب، چمبيلي، Bougainvillea ۽ بوگنويليا لاءِ استعمال ٿيندو آهي ڪجهه هفتن بعد جڏهن پاڙون نڪري وڃن، ته ان کي ڪپي نئين ٻوٽي طور پوکيو ويندو آهي. هي طريقو گلاب، چمپا، رات جي راڻي، ۽ ٻين سدا بهار گلن لاءِ فائدي وارو آهي.

d. **ڳنڍ (Corms):** ڳنڍ هڪ خاص قسم جي تند آهي، جيڪا زمين جي اندر موجود ٿلهي ۽ گولي جي شڪل واري ٿئي ٿي. هي گلن جي نباتاتي واڌ لاءِ هڪ اهم ذريعو آهي، جنهن مان نوان ٻوٽا تيار ٿين ٿا. ڳنڍ جي مٿئين حصي تي نيون تاريون ۽ ٻن نڪرندا آهن، جڏهن ته هيٺئين حصي مان پاڙون ڦٽنديون آهن. جڏهن ڳنڍ مان نئون ٻوٽو نڪري ٿو ته پراڻي ڳنڍ آهستي آهستي سڪي وڃي ٿي ۽ ان جي پراسن نيون ننڍيون ڳنڍون ٺهڻ شروع ٿين ٿيون. هي ننڍي ڳنڍ ڌار ڪري نئين جاءِ تي پوکي سگهجن ٿيون. ڳنڍ ذريعي پوک جي خاصيت اها آهي ته: نئون ٻوٽو جلدي وڌي ٿو، مادري ٻوٽي جي خاصيتن سان هڪجهڙائي رکي ٿو، موسمي تبديلين کي بهتر نموني سان برداشت ڪري سگهي ٿو، وڏي مقدار ۾ نرسرين لاءِ ٻوٽا تيار ڪري سگهجن ٿا. اهو طريقو خاص طور تي گل ليلي (Gladiolus)، فريزيا (Freesia)، ڪروڪس (Crocus)، ۽ ٻين ڳنڍن وارن گلن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ڳنڍن کي پوکڻ وقت احتياط سان سنڀالڻ، صحتمند ڳنڍن جو چونڊڻ، مناسب پوسل، ۽ هلڪي ڇانو مهيا ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن واڌ صحيح نموني سان ٿئي.



اسپنگر قدرت پاران سستي علاج طور تحفو

ميمونہ اسلام ۽ مظفر الدين چاچڙ

اسپنگر جو نباتاتي نالو پلاننگو اويتا (Plantagoovata) آهي ۽ سندس تعلق پلاننگوجينييسي (Plantaginaceae) خاندان سان آهي. اسپنگر کي دوائن واري فصل طور شهرت حاصل آهي. اسپنگر کي اسپغول، سائيلم سيد (Psyllium seed) ۽ ڊسرت انڊين ویت (Desert Indian Wheat) جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. اسپنگر فارسي ٻولي جي ٻن لفظن اسپائي ۽ اگهولي مان نڪتل آهي جنهن جي معني آهي گهوڙي جا ڪن ڇو ته اسپنگر جي ٻج جي شڪل گهوڙي جي ڪن نمايان ٿئي ٿي. اسپنگر جو آبائو وطن ايران، افغانستان، انڊيا East of Mediterranean ۽ اتر آفريڪا آهي.

اسپنگر جي پوک وڏي پيماني تي انڊيا ۾ ٿئي ٿي، جتي 2.93 لک هيڪٽر ايراضي اسپنگر جي پوک هيٺ آهي. جتان اسپنگر کي دنيا جي ٻين ملڪن جهڙوڪ: آمريڪا، برطانيه، فرانس، جرمني، جاپان، انڊونيشيا، ڪينيڊا، ميڪسيڪو، اٽلي، اسپين، سويڊن، ڪوريا، ڊينمارڪ ۽ پاڪستان ڏانهن اماڻيو وڃي ٿو. اسپنگر جون 200 کان وڌيڪ جنسون آهن جنهن مان 10 جنسون انڊيا ۾ پوکيون وڃن ٿيون. جنهن ۾ ٽي جنسون پلاننگو اويتا (Plantagoovata)، پلاننگو سائيلم (Plantagopsyllium) ۽ پلاننگو انڊيڪا (Plantagoindica) وڌيڪ اهم سمجهيون وڃن ٿيون ڇاڪاڻ ته انهن جي پوک تجارتي سطح تي ڪئي ويندي آهي.

اسپنگر جي پوک هر قسم جي زمين ۾ ڪري سگهجي ٿي پر هلڪي وارياسي يا لتياسي، سٺي نيڪاسي واري زمين جنهن جي ڪارپڊ 7 کان 8 هجي، ان کي اسپنگر جي پوک لاءِ موزون سمجهيو وڃي ٿو. اسپنگر ربيع جو فصل آهي، سندس پوک نومبر کان ڊسمبر تائين ڪري سگهجي ٿي. اسپنگر کي وچولي مقدار ۾ پاڻ ۽ پاڻي جي ضرورت پوي ٿي. اسپنگر هڪ سالانو جڙي ٻوٽي

وارو فصل آهي. جيڪو 119 کان 130 ڏينهن اندر پنهنجي پيداوار لاهي ٿو. سندس ٻن ڊگها ۽ سنها ٿين ٿا ۽ ٻوٽي جو قد هڪ کان ڏيڍ فوٽ ٿئي ٿو. اسپنگر جو ٻوٽو 25 کان 50 گوشا (Tillers) پيدا ڪري ٿو ۽ هر هڪ گوشي ۾ هڪ سنگ (Spike) موجود هوندو آهي جنهن ۾ نر ۽ مادي گل ڇڳن جي صورت ۾ ٿين ٿا ۽ انهن گلن ۾ لڳ واري عمل کانپوءِ ٻج ٺهي ٿو. سنگ ۾ ٻج تيار ٿيڻ کان پوءِ ڇاڙهي صاف ڪري استعمال ۾ آڻجي ٿو.

اسپنگر کي مختلف بيمارين جي لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو جهڙوڪ: قبضي، بواسير، گئس، معدي جي تيزابيت، السر، الٽي ۽ جلاب، پيٽ جو سور وغيره. اسپنگر ۾ موجود تانڊورا (Fibers) ٽوله واري چرٻي کي گهٽ ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا ۽ پٺڻ دل جي مسئلن جهڙوڪ: بلڊ پريشر کي گهٽ ڪرڻ، نسن ۾ موجود چرٻي کي گهٽائڻ ۽ دل جي مشڪن (Muscles) کي مضبوط ڪن ٿا. اسپنگر جي استعمال سان رت ۾ موجود شگر جي سطح گهٽجي ٿي. جنهن سان مٺي پيشاب واري بيماري (Diabetes) تي ضابطو آڻڻ ۾ مدد ملي ٿي.

اسپنگر جو استعمال کاڌي وارين شين ۾ ٿئي ٿو جهڙوڪ: سوپ، ڪسٽرڊ، ڪيرٽي، مٺهائي، آئس ڪريم، پاستا ۽ ڊبل روٽي ٺاهڻ ۾ ڪتب اچي ٿي. ان کان علاوه مختلف ڪاسميٽڪس ۾ به ان جو استعمال ڪيو ويندو آهي. پاڪستان ۾ اسپنگر جي پوک اوڀر پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان ۾ ڪئي ويندي آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ اسپنگر جي پوک ميرپورخاص ۽ حيدرآباد ڊويزن جي علائقن ۾ ٿئي ٿي. اتر سنڌ جي علائقن ۾ اسپنگر جي پوک سارين جي پوسل واري زمين تي ٿئي ٿي. وڌندڙ آبادي ۽ صحت جي بيشمار مسئلن جي ڪري ايندڙ ڏينهن ۾ اسپنگر جي گهرج ۾ واڌارو ايندو. جڏهن ته ٻاهرين ملڪن ۾ اسپنگر جي گهرج ايتري ته وڌيڪ آهي جو انڊيا ۾ اسپنگر کي ٺاڻي واري فصل طور پوکيو وڃي ٿو. اميد آهي ته پاڪستان ۾ خاص ڪري سنڌ ۾ اسپنگر جي پوک ڏانهن ڌيان ڏنو ويندو، جنهن سان ملڪي ٺاڻي ۾ اضافو ٿيندو.



نامياتي زراعت ۽ ٿر

مصطفيٰ نانگراج

دنيا ۾ عام طور تي زراعت ٻن قسمن جي ٿئي ٿي؛ نامياتي زراعت (Organic Agriculture) يعني جنهن جي پوکي راهيءَ لاءِ ڪوبه ڪيميائي پاڻ، پيسٽيسائيڊ، گاهه مار زهر وغيره جو استعمال نٿو ڪيو وڃي. ۽ ٻي غير نامياتي زراعت جنهن ۾ ڪيميائي پاڻ وغيره استعمال ڪري سٺي پيداوار حاصل ڪئي وڃي.

هن وقت دنيا ۾ نامياتي زراعت مان حاصل ٿيندڙ خوراڪ ۽ ٻين شين جي گهر وڌي رهي آهي ڇاڪاڻ ته نامياتي خوراڪ اندر اهڙا خوراڪي جزا ٿين ٿا، جن جي ڪري دل جي بيمارين ۽ ڪينسر جهڙي مرض سميت اڪثر بيمارين جي خلاف جسم ۾ قوت مدافعت ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ نامياتي خوراڪ ڪائيندڙ ماڻهو بيمارين کان بچيل رهن ٿا. ان ڪري هن وقت دنيا ۾ نامياتي خوراڪ مارڪيٽن ۾ 45 سيڪڙو ٽائين وڌيڪ قيمت تي وڪرو ٿي رهي آهي. نه رڳو نامياتي خوراڪ بلڪ نامياتي زراعت ذريعي پيدا ٿيندڙ ڪپهه جو ڪپڙو پڻ مهانگي اگهه وڪامڻ لڳو آهي. اهڙي طرح نامياتي خوراڪ ڪائيندڙ جانورن جو گوشت، ڪير ۽ ڪڪڙن جا آنا ۽ گوشت به دنيا ۾ هاڻي ماڻهو وڌيڪ قيمت پري واپرائي رهيا آهن ته جيئن هُو صحتمند زندگي گذاري سگهن. ڪرونا جي وبا جي نتيجي ۾ به نامياتي خوراڪ جي گهرج وڌي آهي ڇاڪاڻ ته هن وبا کان بچڻ لاءِ به انسانن کي جسماني قوت مدافعت وڌائڻ جي ضرورت پوي ٿي.

پر جيئن ته نامياتي زراعت جي پيداوار گهٽ لهي ٿي ۽ هر جاءِ اگهه سٺو نٿو ملي ان ڪري آبادگار نامياتي زراعت ۾

دلچسپي گهٽ وٺن ٿا پر نامياتي خوراڪ جي مارڪيٽ ۾ خريدارن پاران گهر وڌي رهي آهي.

ان سلسلي ۾ دنيا جا اهي علائقا جتي جي زراعت قدرتي طور تي نامياتي ٿئي ٿي تن لاءِ ڪمائڻ جو سونهري موقعو آهي. اهڙن علائقن مان سنڌ جو ٿر به هڪ آهي. هتي اڪثر ڪري فصل، ڀاڄيون، ميوو، طبي استعمال جا وڻ ٻوٽا مينهن تي ٿين ٿا جن کي ڪو ڪيميائي پاڻ، ۽ پيسٽيسائيڊ وغيره نٿا ڏنا وڃن تنهن ڪري انهن جي پيداوار 100 سيڪڙو نامياتي آهي. اهڙي طرح ٿر جي وڏن ۽ فطري طور نامياتي چراگاهن ۾ چرندڙ جانورن جو گوشت، ڪير ۽ چمڙو به سٺو سيڪڙو نامياتي آهي. ليڪن هن علائقي جي نامياتي خوراڪ جي ترقي، توسيع، استعمال ۽ مارڪيٽنگ لاءِ ڪي به جديد انتظام ناهن، جنهن ڪري هن قدرتي نامياتي خوراڪ جو نه مقامي ماڻهن کي ڪو خاص فائدو ٿي رهيو آهي جو سندن غربت گهٽجي ۽ آمدني وڌي ۽ نه وري انساني آباديءَ جي صحت لاءِ هيءَ خوراڪ ڪا خاص فائدي مند ٿي رهي آهي.

چند تجويزن جي عمل ذريعي دنيا جي هن اهم قدرتي نامياتي خوراڪي علائقي ٿر کي ترقي وٺائي مقامي آباديءَ سميت دنيا جي مارڪيٽ ۾ خوراڪ پهچائي سگهجي ٿي:

1. نامياتي زراعت جو تحقيقي، توسيعي ۽ مارڪيٽنگ جو ادارو قائم ڪرڻ گهرجي، جنهن لاءِ عالمي سطح جي شراڪت جي مدد حاصل ڪجي. چائينا سان ان سلسلي ۾ ڳالهه ٻولهه ڪجي. ۽ جيئن مختلف روڊ شراڪتي بنيادن تي ٺاهيا وڃن ٿا، اهڙي طرح چائينا سان معاهدو ڪري ٿر ۾ نامياتي زراعت کي هٿي وٺائي سگهجي ٿي.

2. هن معاهدي هيٺ هڪ ته هٿرادو مينهن وسائڻ جو بندوبست ڪيو وڃي ته جيئن فصلن، وڻن ۽ ٻوٽن وغيره جي پيداوار ۾ اضافو ٿئي ۽ جانورن کي گهربل خوارڪ ملي سگهي ۽ سوڪهڙي جي وقت ۾ مالوند ماڻهن کي بيراجي علائقن ڏانهن پنهنجي جانورن کي وٺي وڃڻ جي ضرورت نه پوي.
 3. ٿر کي نامياتي خوراڪ جي علائقي طور عالمي سڃاڻپ لاءِ سرٽيفڪيشن جو بندوبست ڪيو وڃي ته جيئن هتان جي خوراڪ جي خريداريءَ لاءِ دنيا جي ترقي يافتہ ملڪن ۾ دلچسپي وڌي.
 4. ”نامياتي زرعي خوراڪ ڪاروباري زون“ جي سري سان مٺيءَ جي آس پاس جوڙي وڃي جتي هتان جي خوراڪ جي پروسيسنگ ۽ پيڪنگ ۽ مارڪيٽنگ سميت آبادگارن کي فني ۽ مالي سهولتون فراهم ڪرڻ لاءِ بندوبست ٿيل هجي. ان سلسلي ۾ ايشين ڊولپمينٽ بينڪ وغيره به شراڪتي بنيادن تي شريڪ ٿي سگهي ٿي يا ڪا چائنا جي ڪمپني به اچي سگهي ٿي.
 5. ”نامياتي آچار“ جي دنيا ۾ تمام گهڻي گهر آهي. جنهن مان فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ مقامي طور تي تيار ٿيندڙ سنگرن، ڏونٿرن ۽ چانهين وغيره جي آچار کي بهتر بڻائي مقامي آباديءَ جي ذريعي مارڪيٽن تائين پهچايو وڃي.
 6. ڪُنپين جي صحيح طرح پروسيسنگ ۽ پيڪنگ ڪري مارڪيٽن تائين پهچائڻ جو بندوبست ڪيو وڃي.
 7. هتان جي جانورن جي نامياتي گوشت کي جديد بنيادن تي پيڪنگ ۽ ٽڏين گاڏين ذريعي مارڪيٽن ۾ پهچائڻ جو بندوبست ڪيو وڃي.
 8. هتان جي فطري نامياتي ميوون جهڙوڪ؛ جهنگلي بيران وغيره کي ترقي وٺائي وڃي.
 9. ٿر جي علائقي مان طبي استعمال وارين جڙين ٻوٽين ۽ وڻن ٽنن تي تحقيق ڪري، انهن کي دنيا جي مارڪيٽن ۾ پهچايو وڃي.
 10. خشڪ پاڇين جهڙوڪ؛ گوار، ميهن، ڪريلن وغيره تي تحقيقي ڪم ڪري مارڪيٽنگ ڪئي وڃي.
 11. ٿر جي نامياتي ڪنور کي عالمي مارڪيٽن جي گهرج مطابق تيار ڪري اوڏانهن موڪليو وڃي.
 12. هتان جي جانورن جي نامياتي ڪير جي پيڪنگ ۽ مارڪيٽنگ جو بندوبست ڪجي.
- هي ڪم حڪومت سنڌ جا لاڳاپيل ادارا ڪنهن عالمي اداري جي شراڪت سان شروع ڪري سگهن ٿا، جنهن ۾ ٿر جي مقامي آباديءَ جي هر سطح تي مڪمل شرڪت هجي. مقامي ٿري ڪاروبار جي هر مقامي ۽ عالمي سطح تي پائيواري هجن. جيڪو ادارو يا ڪمپني ڪم شروع ڪري تنهن جي هن ڪاروبار ۾ قانوني طور تي مقامي آباديءَ جي اڪثريت ۾ شراڪت هئڻ گهرجي.
- ان سلسلي ۾ ”ٿر جي نامياتي زراعت“ جو منصوبو تيار ڪرڻ وقت مقامي آباديءَ جي قانوني ۽ پائدار حصيداريءَ لاءِ ڪو قانون پڻ هجڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان ٿر جي نامياتي زراعت کي ترقي ملندي. مقامي آباديءَ لاءِ روزگار جي موقعا ڪلندا ۽ سندن غربت ۾ گهٽتائي ايندي. صوبي ۽ ملڪ جي آمدنيءَ ۾ اضافو ٿيڻ سان گڏ غير ملڪي ناڻو حاصل ٿي سگهندو.





ماهور زرعي سائنس ۾ اشتهار ڏيڻ لاءِ اگه

عنوان	سائيز	رنگين	بليڪ اينڊ وائيت
مڪ ٽائيٽل	چوٿون حصو	Rs:25,000/=	-
مڪ ٽائيٽل	اڌ صفحو	Rs:50,000/=	-
بيڪ ٽائيٽل (ٻاهريون)	سڄو صفحو	Rs:60,000/=	-
بيڪ ٽائيٽل (ٻاهريون)	اڌ صفحو	Rs:30,000/=	-
انر (مڪ صفحي جو)	سڄو صفحو	Rs:45,000/=	Rs:25,000/=
انر (پنئين صفحي جو)	سڄو صفحو	Rs:35,000/=	Rs:20,000/=
انڊريان صفحا	سڄو صفحو	Rs:25,000/=	Rs:15,000/=

مواد موڪلڻ ۽ اشتهارن جي رابطي لاءِ:

چيف ايڊيٽر، ماهوار زرعي سائنس
 سنڌ زرعي سائنس سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٽامالاجي
 سنڌ زرعي يونيورسٽي، ٽنڊوڄام
 Email: bksolangi@gmail.com
 Cell# 0300-3796765

مِني آرِين فاريست

سنت زرعِي يونيورسٽي، ٽنڊوڄام



مواد موڪلڻ ۽ رابطي لاءِ:

چيف ايڊيٽر، ماهوار زرعي سائنس،

سنت زرعي سائنس سوسائٽي، ڊپارٽمينٽ آف اينٽامالاجي،

سنت زرعي يونيورسٽي، ٽنڊوڄام

Email: bksolangi@gmail.com

Cell # 0300-3796765